

BEST LACTOCARE

SOSTANZA DI BASE UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA CON AZIONE FUNGICIDA

Il **SIERO DI LATTE** è incluso nella categoria delle sostanze di base. Numerose ricerche mostrano la sua efficacia per il controllo dell'oidio: diversi componenti del latte producono radicali dell'ossigeno che contribuiscono a ridurre l'impatto della malattia sulle foglie trattate. Il siero di latte danneggia le ife e i conidi dell'oidio nelle prime 24 ore dal trattamento.

VANTAGGI E FINALITÀ

- Riduce la proliferazione della malattia
- Danneggia ife e conidi dell'oidio
- Effetto preventivo e curativo

AVVERTENZE

Prodotto da nebulizzare sul fogliame, distribuirlo in presenza di sole, preferibilmente al mattino. Non conservare in contenitori di metallo. Per garantire le massime prestazioni si consiglia di tamponare il pH della soluzione tra 5,5-6. Non miscelare **BEST LACTOCARE** con prodotti a base di rame, oli o miscele solfo-calcio.
Se impiegato congiuntamente a prodotti a reazione alcalina può ridurre significativamente la sua efficacia. Se si desidera abbinare ad altri trattamenti (fitosanitari, tensioattivi, fertilizzanti, ecc.) è assolutamente consigliato eseguire un test di compatibilità e di fitotossicità su una piccola porzione.
A causa della scarsa adesività del siero di latte sulle foglie si consiglia di aggiungere un prodotto tensioattivo o adesivante, così da migliorare l'efficacia del trattamento.

COMPOSIZIONE

Siero di latte (CAS 92129-90-3)
Livello di purezza: CODEX STAN 289-1995

FORMULAZIONE

Concentrato solubile

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

Densità	**1,24 kg/L**
pH	**6**

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	PATOLOGIA	EPOCA	N° (MIN/MAX) APPLICAZIONI	INTERVALLO MINIMO	DOSAGGIO (MIN/MAX)
Cetriolo, Zucchino (in serra)	Oidio	Dalla 9a foglia alla comparsa delle prime infiorescenze (BBCH 19-49)	3-5	7 giorni	**30-240 ml/hl** Adacquamento 1000-1500 L/ha
Vite (pieno campo)	Oidio	Dal primo germoglio alla chiusura del grappolo (BBCH 10-57)		7-10 giorni	**30-240 ml/hl** Adacquamento 100-300 L/ha
Pomodoro (pieno campo/serra)	*Begomovirus* TYLCV (virus della foglia gialla)	Dalla prima infiorescenza visibile (BBCH 10-51)		3-4 giorni	**30-240 ml/hl** Adacquamento 1000-1500 L/ha

Il prodotto non ha intervallo di carenza.

GF0479 8 029816 054795 FLACONE 12x1 L IVA 22%