

CRISEI

INSETTICIDA A BASE DI PERETRINE

CARATTERISTICHE


CRISEI è un insetticida ad ampio spettro a base di Piretro naturale per il controllo di insetti su diverse colture, tanto in pieno campo come in serra. La sua formulazione liquida è al 100% di origine vegetale. Possiede azione per contatto e per ingestione. La sua azione è rapida (forte potere abbattente) e di breve persistenza. **CRISEI** può essere utilizzato in lotta biologica e il lancio degli insetti utili va realizzato subito dopo che la vegetazione trattata si è asciugata. I trattamenti devono essere eseguiti in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche.

POTENTE EFFETTO ABBATTENTE

L'effetto *knock-down* di **CRISEI** provoca la rapida riduzione dei parassiti dopo la sua applicazione.

Presenza di cicaline nella vite.
Controllo della popolazione

AZIONE RAPIDA



Test di registrazione in condizioni GEP. IT16025E262.


INSETTICIDA NATURALE AD AMPIO SPETTRO

CRISEI è efficace contro più di 140 specie di insetti adulti e forme larvali.

% Efficacia di CRISEI contro i parassiti

EFFICACIA COMPROVATA

Efficacia media della batteria dei test di registrazione in condizioni GEP.



Autorizzazione Ministero della Salute
n. 17548 del 28.04.2020
Titolare dell'autorizzazione: Seipasa, S.A.

FORMULAZIONE BREVETTATA

CRISEI è stato sviluppato sulla base di una formulazione esclusiva e unica nella sua categoria.
BREVETTO ES2444991A1

COMPOSIZIONE

Piretrine pure (da estratto di piretro 480 g/kg)	2,14% (20 g/L)
Coformulati q.b. a	g 100

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (EC)



MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	INSETTI	DOSE	RACCOMANDAZIONI
Pomodoro e Melanzana (in campo e serra)	Mosca bianca (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporarorium*)	150-225 ml/hl (dose min. 0,9 L/ha, max. 1,5 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 300-1000 L/ha	Intervenire all'inizio dell'infestazione. Effettuare massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7 giorni
Peperone (in campo e serra)	Afidi (*Myzus persicae, Aphis gossypii*)	120-180 ml/hl (dose min. 0,7 L/ha, max. 1,2 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 300-1000 L/ha	
Lattughe e insalate: foglie di Spinaci e simili; erbe fresche e fiori commestibili (incluse baby leaf) (in campo)	Afidi (*Nasonovia ribisnigri, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*)	150-200 ml/hl (dose min. 0,7 L/ha, max. 1,5 L/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 300-750 L/ha	
Vite (in campo)	Cicaline (*Cicadellidae - Empoasca vitis, Scaphoideus titanus, Jacobiasca lybica*)	Compresa tra 0,7 L/ha (min) e 1,5 L/ha (max), distribuita con volumi d'acqua di 200-800 L/ha	

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta in Pomodoro, Melanzana, Peperone, Lattughe e Spinacio. Sospendere i trattamenti 3 giorni prima sulla Vite.

GA0097 8 029962 050979 FLACONE 12x1 L IVA 10%