

ESTRATTO DI EQUISETO

SOSTANZA DI BASE AD AZIONE FUNGICIDA CONTRO PERONOSPORA, BOLLA, MUFFA E ALTRI FUNGHI

Prodotto a base di equiseto (Equisetum arvense.), sostanza di base presente in natura, nota per le sue proprietà fungicide. Applicabile su diverse tipologie di piante (Melo, Pesco, Vite, Orticole), **agisce contro diverse tipologie di funghi, quali ticchiolatura, oidio, bolla, peronospora**.

COMPOSIZIONE

100% *Equisetum arvense* di purezza conforme alla Farmacopea Europea

FORMULAZIONE

Liquido concentrato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	AVVERSITÀ		DOSE	APPLICAZIONE
Melo e pesco	*Ticchiolatura*	*Venturia inequalis*	300-500 ml/hl	In primavera, da 2 a 6 applicazioni per via fogliare distanziate di 7 giorni.
	Oidio	*Podosphaera leucotricha*		
	Bolla	*Taphrina deformans*		
Vite	*Peronospora*	*Plasmopara viticola*		Da primavera a estate, da 2 a 6 applicazioni per via fogliare distanziate di 7 giorni.
	Oidio	*Erysiphe necator*		
Cetriolo	*Oidio*	*Podosphaera xhantii*		Spruzzatura fogliare o applicazione diretta al suolo. 2 applicazioni distanziate di 3 o 4 giorni.
	Funghi del suolo	*Pythium spp.*		
Pomodoro	*Marciume precoce*	*Alternaria solani*		In estate, 2 applicazioni per via fogliare distanziate di 14 giorni.
	Septoria	*Septoria Lycopersici*		
Fragola e lampone	*Muffa grigia*	*Botrytis cinerea*		Dalla comparsa delle foglie al secondo raccolto, 2 applicazioni per via fogliare distanziate di 5-14 giorni.
	Oidio	*Podosphaera aphanis*		
	Peronospora	*Phytophtora fragrariae*		
	Altri funghi	*Colletotrichum acutatum*		
Patata	*Peronospora*	*Phytophtora infestans*		Dalla comparsa delle foglie allo sviluppo dei tuberi, da 4 a 8 applicazioni per via fogliare distanziate di 5-14 giorni.
	Marciume nero	*Alternaria solani*		
	Oidio	*Erysiphe cichoracearum*		

30-50 ml / 10 L di acqua

GB0201	8 029816 012016	FLACONE 24x100 ml IVA 22%	
GB0215	8 029816 012153	FLACONE 12x1 L IVA 22%	
GF0449	8 029816 054498	TANICA 4x5 L IVA 22%	