

ESTRATTO DI ORTICA

BIO

SOSTANZA DI BASE AD AZIONE INSETTICIDA, ACARICIDA E FUNGICIDA CONTRO AFIDI, LEPIDOTTERI, COLEOTTERI, ACARI E FUNGHI

Prodotto a base di ortica (Urtica spp.), sostanza di base presente in natura, nota per le sue proprietà insetticide, acaricide e fungicide. Applicabile su diverse tipologie di piante (alberi da frutto, insalate, patata, floreali), **agisce contro insetti quali afidi, tignole, carpocapsa, ragnetto rosso** e contro funghi, quali alternaria, oidio, muffa, peronospora.

40-50 ml / 10 L di acqua

COMPOSIZIONE

100% *Urtica spp* di purezza
conforme alla Farmacopea Europea

FORMULAZIONE

Liquido concentrato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

	COLTURE	INSETTO / AVVERSITÀ		DOSE	APPLICAZIONE
USO CONTRO INSETTI	Alberi da frutto (melo, prugno, pesco, ribes, noce, ciliegio)	*Afidi*	*Myzus persicae, Macrosiphum rosae, Eriosoma lanigerum, Cryptomyzus ribis , Callaphis juglandis, Myzus cerasi*	400-500 ml/hl	Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Fagiolo	*Afidi*	*Aphis fabae*		Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Patata	*Afidi*	*Myzus persicae*		Dalla primavera fino alla formazione dei tuberi, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Vegetali a foglia (lattuga, cavolo)	*Afidi*	*Brevicoryne brassicae Nazonoviaribis nigri*		Dalla primavera fino alla formazione delle foglie stese, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Sambuco	*Afidi*	*Aphis sambuci*		In primavera estate, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Rosacee (Rosa, spirea)	*Afidi*	*Macrosiphum rosae, Aphis spiraephaga*		In primavera estate, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Brassicacee (cavolo, colza, ravanello)	*Altica Tignola*	*Phyllotreta nemorum Plutella xylostella*		Dalla primavera fino alla formazione delle foglie stese, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Melo, pero	*Carpocapsa*	*Cydia pomonella*		In primavera, 3 trattamenti intervallati di 15 giorni.
USO CONTRO FUNGHI	Brassicacee (senape, rapanello)	*Alternaria*	*Alternaria spp.*	400-500 ml/hl	Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Cucurbitacee (cetriolo)	*Oidio Alternaria*	*Erysiphe polygoni Alternaria alternata*		Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Alberi da frutto (melo, prugno, pesco, ciliegio)	*Alternaria, Moniliosi Muffa grigia, Muffa nera del pane*	*Alternaria alternata, Monilinia laxa, Botrytis cinerea Rhizopus stolonifer*		Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Vite	*Peronospora*	*Plasmopara viticola*		Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
	Patata	*Peronospora*	*Phytophthora infestans*		Dalla primavera fino alla formazione dei tuberi, da 1 a 5 applicazioni intervallate di 7-15 giorni.
USO CONTRO ACARI	Fagiolo	*Ragnetto Rosso*	*Tetranychus urticae*	400-500 ml/hl	Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-21 giorni.
	Vite	*Ragnetto Rosso*	*Tetranychus urticae Tetranychus Telarius*		Dalla primavera estate fino a maturazione, da 1 a 6 applicazioni intervallate di 7-21 giorni (3 applicazioni prima della fioritura e 3 applicazioni dopo la fioritura).

GB0200	8 029816 012009	FLACONE	24x100 ml	IVA 22%
GB0211	8 029816 012115	FLACONE	24x250 ml	IVA 22%
GB0212	8 029816 012122	FLACONE	12x1 L	IVA 22%
GF0448	8 029816 054481	TANICA	4x5 L	IVA 22%