

SEITYLIS®

FUNGICIDA A BASE DI *BACILLUS SUBTILIS* CEPPO IAB/BS03

SEITYLIS® è un fungicida a base di *Bacillus Subtilis* ceppo IAB/BS03 per la protezione degli ortaggi (cucurbitacee in serra e insalate in pieno campo) contro Oidio e Peronospora e della frutta (pomacee) contro Ticchiolatura.
SEITYLIS® è un prodotto fitosanitario a basso rischio secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2009 art. 47.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Effettuare trattamenti spray fogliari sulle colture sotto riportate. Applicare preventivamente prima che la malattia si sviluppi e successivamente in base al rischio. In caso di sviluppo di malattia o di alta pressione della stessa, **SEITYLIS®** dovrebbe essere abbinato ad altri fungicidi. Applicare un volume sufficiente di miscela per garantire una copertura completa della frutta ed ortaggi trattati, evitando il gocciolamento.

COMPATIBILITÀ

SEITYLIS® può essere utilizzato in combinazione ad altri fungicidi, insetticidi e fertilizzanti. Non potendo testare tutte le miscele possibili, occorre accertarsi presso il distributore della compatibilità della miscela che si desidera impiegare. Le miscele vanno preparate in conformità alla legislazione vigente e alle raccomandazioni di buona prassi agricola.

AVVERTENZE

Il rischio di sviluppo di resistenze è limitato considerando la modalità di azione non diretta del prodotto.

Autorizzazione Ministero della Salute
n. 18010 del 09.03.2022
Titolare dell'autorizzazione: Seipasa, S.A.

COMPOSIZIONE

Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03 (pari a 1 x 10^8 UFC/g)	1%
Coformulati q.b. a	g 100

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile (WP)

DOSI E MODALITÀ D'USO

COLTURE	PARASSITA	DOSI D'IMPIEGO	VOLUMI D'ACQUA L/HA	NUMERO MASSIMO DI APPLICAZIONI	INTERVALLO TRA LE APPLICAZIONI	PERIODO DI APPLICAZIONE
Cetriolo, Zucchine, Cetriolini e altre cucurbitacee con buccia commestibile (in serra)	Oidio (Mal Bianco)	0,5-1,5 kg/ha	500-1500	5*	5-7 giorni	Dalla 7ª foglia vera sino alla raccolta
Mele, Pere, Cotogne, Nespole, Pere (Nashi), Mela selvatica	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)*	0,5-1,5 kg/ha	500-1500	8**	7-14 giorni	Dalla fase orecchiette di topo all'allegagione
Lattuga, Cicoria, Scarola, Indivia riccia, Dolcetta, Rucola e altre Insalate (pieno campo)	Peronospora	0,4-1,2 kg/ha	400-1200	5	7-14 giorni	Dall'inizio dello sviluppo vegetativo al raggiungimento del 60% della dimensione finale

*Effettuare la prima applicazione prima del primo attacco (applicazione preventiva). Le applicazioni devono essere effettuate di sera per garantire un periodo più lungo di elevata umidità.
**Applicare già nella prefioritura con un intervallo di 14 giorni, quindi effettuare 6 applicazioni dopo la fioritura a intervalli di 7-14 giorni.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 1 giorno prima della raccolta di Cetriolo, Zucchine, Cetriolini e altre cucurbitacee con buccia commestibile (in serra) e Lattuga, Cicoria, Scarola, Indivia riccia, Dolcetta, Rucola e altre Insalate (pieno campo).

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE E APPLICAZIONE: riempire il serbatoio dell'irroratrice per metà con acqua pulita e avviare l'agitatore. Versare la dose prestabilita di prodotto e riempire il serbatoio con acqua fino al livello necessario. Durante l'irrorazione lasciare acceso l'agitatore. Assicurarsi sempre che gli ugelli siano puliti, mantenuti in piena efficienza e calibrati secondo le indicazioni del produttore. Al termine di ogni giorno di impiego del prodotto, lavare accuratamente il nebulizzatore con acqua seguendo le procedure standard di pulizia.

GA0100 8 029962 051006 ASTUCCIO 10x1 kg IVA 10%