

SITARI® 700 L
ZOLFO LIQUIDO

CORRETTIVO - SOSPENSIONE DI ZOLFO IN ACQUA

Lo zolfo correttivo abbassa il pH del terreno, migliorando così la disponibilità dei microelementi per la pianta. Inoltre la carenza di zolfo è un grave fattore limitante delle rese quantitative e qualitative, in quanto è elemento fondamentale per la sintesi proteica. **SITARI® 700 L** è un'innovativa formulazione in sospensione concentrata a base di zolfo, appositamente studiata al fine di migliorare la qualità e la produzione dei cereali, delle colture industriali, delle colture orticole e della vite.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Incremento delle rese quantitative.
- Incremento qualitativo: incremento delle proteine totali, incremento della frazione proteica "nobile" (glutine).

MISCIBILITÀ

SITARI® 700 L non è miscibile con oli minerali e con prodotti alcalini.
In caso di miscele particolari è sempre preferibile un test preliminare di compatibilità.

AVVERTENZE

In presenza di varietà notoriamente sensibili allo zolfo o di nuove varietà, si consiglia di effettuare un test di selettività su di una piccola superficie.

ATTENZIONE:
H315

BIO CONTROL

COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale **51% (700 g/L)**
Materie prime: zolfo elementare

FORMULAZIONE

Sospensione concentrata

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH (sol. 1%) **4,9**
Peso specifico a 20°C **1,36 kg/L**

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Vite	2-4 L/ha	
Pomacee, Drupacee	2-3 L/ha	
Olivo	2-4 L/ha	
Nocciolo, Mandorlo	4-6 L/ha	
Cereali (Frumento duro e tenero, Orzo, Riso)	4-8 L/ha	1ª applicazione allo stadio di fine accestimento-"spiga 1 cm". 2ª applicazione allo stadio di "botticella"-spigatura.
Mais	4-8 L/ha	Allo stadio di 4-8 foglie.
Barbabietola da zucchero, Soia, Girasole	4-8 L/ha	Allo stadio di 4-6 foglie. Per carenze gravi ripetere l'applicazione ad intervalli di 10-14 giorni.
Brassicacee (Cavoli, Colza, ecc.)	4-8 L/ha	
Colture Orticole	2-3 L/ha	
Patata	2-3 L/ha	Ad una settimana dalla completa emergenza. Ripetere l'applicazione dopo 10-14 giorni se necessario.
Pomodoro	2-3 L/ha	A partire dallo stadio di 4-6 foglie. Ripetere ad intervalli di 10-14 giorni se necessario.

20-40 ml / 10 L di acqua

GB0216	8 029816 012160	FLACONE 24x250 ml IVA 4%	
GB0126	8 029816 011262	FLACONE 12x1 kg IVA 4%	
GF0313	8 029816 053132	TANICA 4x5 L IVA 4%	