PRORADIX®

FUNGICIDA BIOLOGICO A BASE DI PSEUDOMONAS SP. DSMZ13134 PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE FUNGINE DEL TERRENO



PRORADIX® è un fitofarmaco microbiologico a base di Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, in formulazione polvere bagnabile, **per la prevenzione e il contenimento dei patogeni del terreno ed in particolare contro la *Rhizoctonia spp. Fusarium spp. e l'Helminthosporium solani,*** sia in pieno campo che in serra, in grado di migliorare la produzione in termini sia quantitativi sia qualitativi, portando maggiore reddito agli agricoltori. Le differenti modalità di azione lo rendono una **soluzione efficace e alternativa ai comuni fitofarmaci chimici** per la protezione di queste colture, con un bassissimo rischio di creare resistenze e nessun residuo.

VANTAGGI E FINALITÀ

- Bio-fungicida preventivo.
- Controlla efficacemente le malattie del terreno, in particolare Rhizoctonia e Fusarium.
- Unico *Pseudomonas* autorizzato per gli ortaggi in europa
- Classificato non pericoloso per l'uomo e l'ambiente
- Ammesso in Agricoltura Biologica, secondo reg. CE 889/2008.
- Differenti modalità di azione, per cui risulta più difficile per le malattie sviluppare resistenze.
- Nessun residuo sulle colture.
- Effetto biostimolante su radici, piante e frutti.

Autorizzazione Ministero della Salute
n. 15.260 del 30.06.2016.
Titolare dell'autorizzazione: SP Sourcon Padena GmbH

REGISTRATO FiBL

COMPOSIZIONE

Pseudomonas spp. ceppo DSMZ 13134 **6,6 x 10^{10} UFC/g**
Coformulati q.b. a **g 100**

FORMULAZIONE

Polvere bagnabile

INTERVALLO DI SICUREZZA

1 giorno per tutte le colture edibili

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	MALATTIA	DOSI	NOTE
Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone, Pepino)	Fusarium spp. e Rhizoctonia spp.	100-125 g/ha	Effettuare la prima applicazione pre/al trapianto, e successivamente, per massimo 3 applicazioni/ciclo colturale, ogni 15-30 giorni.
Patata e altri ortaggi a tubero	Rhizoctonia solani ed Helminthosporium solani	60 g prodotto per ettaro o 2 g/100 kg di tuberi	Applicazione ai tuberi prima o durante la semina con sistema chiuso (Mafex) o attrezzature specifiche.
Cucurbitacee (Melone, Anguria, Cetriolo, Zucchino, Zucca) contro	Fusarium spp. e Rhizoctonia spp.	100-125 g/ha	Effettuare la prima applicazione pre/al trapianto, e successivamente, per massimo 3 applicazioni/ciclo colturale, ogni 15-30 giorni.
Fragola	Rhizoctonia spp.	100-125 g/ha	Effettuare la prima applicazione pre/al trapianto, e successivamente, per massimo 3 applicazioni/ciclo colturale, ogni 15-30 giorni.
Ortaggi a foglia	Rhizoctonia spp.	100-125 g/ha	Effettuare la prima applicazione pre/al trapianto, e successivamente, per massimo 2-3 applicazioni/ciclo colturale, ogni 15-30 giorni.
Quinoa, Ravanello	Rhizoctonia spp.	100-125 g/ha	Effettuare la prima applicazione pre/al trapianto, e successivamente, per massimo 2-3 applicazioni/ciclo colturale, ogni 15-30 giorni.
Brassicacee	Fusarium spp. e Rhizoctonia spp.	100-125 g/ha	Effettuare la prima applicazione pre/al trapianto, e successivamente, per massimo 2-3 applicazioni/ciclo colturale, ogni 15-30 giorni, alla dose.
Erbe fresche	Fusarium spp. e Rhizoctonia spp.	100-125 g/ha	Effettuare la prima applicazione pre/al trapianto, e successivamente, per massimo 2-3 applicazioni/ciclo colturale, ogni 15-30 giorni.

GA0095 4 260499 091088 BUSTA 20x12,5 g IVA 10%

GA0096 4 260499 091088 BUSTA 10x125 g IVA 10%