FUNGICIDA SISTEMICO

Momentum PFnPE

FUNGICIDA SISTEMICO PER PIANTE DESTINATE AL CONSUMO ALIMENTARE



Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui **non presenta rischi collegati al dilavamento**, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che **consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.**



VITE



AGRUMI



PERO

Reg. Ministero della Salute
n. 18244 del 30/12/2022

COMPOSIZIONE

Fosetil Alluminio puro **g. 80**

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

DOSE

Vite, Pero: 25 g per 10 L di acqua per 100 m^2
Agrumi: 30 g per 10 L di acqua per 70 m^2

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	DOSE	NOTE
Vite	4,5 g di prodotto in 1,8 L di acqua per 18 m^2 per singola applicazione	Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare MOMENTUM in miscela con fungicidi di contatto al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia. Intervallo minimo tra i trattamenti: 10 giorni. **Intervallo di sicurezza** tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **28 giorni.**
Agrumi (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo)	4,5 g di prodotto in 1,5 L di acqua per 10 m^2 per singola applicazione	Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire efficientemente il prodotto, è possibile eseguire applicazioni con "pennellature" della stessa soluzione (2,5 -3 g di prodotto per L di acqua) sulle zone infette del tronco e delle branche. Intervallo minimo tra i trattamenti: 90 giorni. **Intervallo di sicurezza** tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **15 giorni.**
Pero	4,5 g di prodotto in 1,5 L di acqua per 10 m^2 per singola applicazione	Trattamenti nel periodo aprile-giugno. Intervallo minimo tra i trattamenti: 10 giorni. **Intervallo di sicurezza** tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **15 giorni.**

AVVERSITÀ



PERONOSPORA



PHYTOPHTHORA

EFFICACE CONTRO LA PERONOSPORA

GH0475 8 029816 034759 ASTUCCIO 24x180 g IVA 10%