

HYDRA K30 | BEST ENERGY K

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI NPK 15-5-30 CON MICROELEMENTI

HYDRA K30 è un concime fogliare idrosolubile completo, di elevata purezza e rapida solubilità. Consigliabile su tutte le colture nelle fasi intermedie e finali del ciclo vegetativo, migliora la colorazione, il contenuto in zuccheri e le principali caratteristiche organolettiche dei frutti.

20-40 g / 10 L di acqua

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	**15%**
Azoto (N) nitrico	**6,6%**
Azoto (N) ammoniacale	**5,3%**
Azoto (N) ureico	**3,1%**
Anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile	**5%**
Ossido di Potassio (K_2O) idrosolubile	**30%**
Boro (B) ossiacido idrosolubile	**0,01%**
Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile	**0,006%**
Ferro (Fe) chelato con EDTA idrosolubile	**0,05%**
Manganese (Mn) chelato EDTA idrosolubile	**0,02%**
Molibdeno (Mo) sodio idrosolubile	**0,004%**
Zinco (Zn) chelato con EDTA idrosolubile	**0,008%**
Agente chelante	**EDTA**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata	**4-7,5**

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina idrosolubile

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Vite	300-400 g/hl	1° prima della fioritura - 2° dopo l'allegagione - 3° due settimane dopo il 2° trattamento.
Agrumi	400-450 g/hl	1° dopo la fioritura - 2° durante l'estate.
Fruttiferi	250-300 g/hl	2-4 trattamenti.
Fragola	200-250 g/hl	1° un mese dopo il trapianto - 2° 20 giorni dopo - Ripetere 3 applicazioni alla ripresa vegetativa. Continuare se necessario.
Orticole da trapianto	500-600 g/hl	3 applicazioni distanziate di 20 giorni.
Pomodoro, Peperone, Melanzana	200-250 g/hl	4-5 applicazioni.
Melone, Cocomero e Zucchino	350-400 g/hl	4-5 trattamenti successivi distanziati di 15-20 giorni.

GF0551	8 029816 055518	BEST ENERGY K	ASTUCCIO	30x100 g	IVA 4%
GF0140	8 029816 051404	HYDRA K30	BUSTA	10x2,5 kg	IVA 4%
GH0348	8 029816 053484	BEST ENERGY K	ASTUCCIO	20x1 kg	IVA 4%