HYDRA | BEST ENERGY

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI NPK 20-20-20 CON MICROELEMENTI



HYDRA è un concime fogliare idrosolubile completo, di elevata purezza e rapida solubilità, concepito per un impiego versatile durante l'intero ciclo vegetativo delle colture. Assicurando l'apporto di un completo corredo di nutrienti, favorendo uno sviluppo equilibrato delle piante trattate. È indicato per sostenere le colture nelle fasi di fioritura, allegagione ed inizio ingrossamento frutti. Utilizzato su fruttiferi in fase di pre-caduta foglie, consente l'accumulo di sostanze di riserva nelle nuove gemme.

20-40 g / 10 L di acqua

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	**20%**
Azoto (N) nitrico	**5,6%**
Azoto (N) ammoniacale	**3,8%**
Azoto (N) ureico	**10,6%**
Anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile	**20%**
Ossido di Potassio (K_2O) idrosolubile	**20%**
Boro (B) ossiacido idrosolubile	**0,01%**
Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile	**0,006%**
Ferro (Fe) chelato con EDTA idrosolubile	**0,05%**
Manganese (Mn) chelato EDTA idrosolubile	**0,02%**
Molibdeno (Mo) sodio idrosolubile	**0,004%**
Zinco (Zn) chelato con EDTA idrosolubile	**0,008%**
Agente chelante	**EDTA**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata **4-7,5**

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina idrosolubile

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Vite	250-300 g/hl	1° prima della fioritura - 2° dopo l'allegagione - 3° due settimane dopo il 2° trattamento.
Agrumi	400-450 g/hl	1° dopo la fioritura - 2° durante l'estate.
Fruttiferi	250-300 g/hl	2-4 trattamenti dalla ripresa vegetativa in abbinamento ai trattamenti di prodotti fitosanitari.
Fragola	200-250 g/hl	1° un mese dopo il trapianto - 2° 20 giorni dopo - Ripetere 3 applicazioni alla ripresa vegetativa. Continuare se necessario.
Orticole da trapianto e tabacco	500-600 g/hl	Subito dopo il trapianto 3 applicazioni distanziate di 20 giorni.
Melone, Cocomero e Zucchino	350-400 g/hl	1° trattamento subito dopo il trapianto. Altri 4-5 trattamenti successivi distanziati di 15-20 giorni.
Pomodoro, Peperone, Melanzana	200-250 g/hl	4-5 applicazioni da subito dopo il trapianto a dopo l'allegagione di ogni palco fiorale.

GF0550	8 029816 055501	BEST ENERGY	ASTUCCIO	30x100 g	IVA 4%
GF0138	8 029816 051381	HYDRA	BUSTA	10x2,5 kg	IVA 4%
GH0300	8 029816 053002	BEST ENERGY	ASTUCCIO	20x1 kg	IVA 4%