

KIRON 4,8 o-o | CHELATO DI FERRO

CONCIME CE - CHELATO DI FERRO EDDHA 6% (4,8% ORTO-ORTO) IN MICROGRANULI PER USO RADICALE

KIRON 4,8 o-o è un chelato di ferro EDDHA di elevata qualità, specifico per applicazioni radicali. Previene e cura la clorosi ferrica, intervenendo in via preventiva e/o alla prima comparsa dei sintomi (ingiallimento delle foglie). Il prodotto assicura un'alta percentuale di ferro legato chimicamente nella sua forma più stabile (orto-orto) e quindi rende il ferro efficace e disponibile anche nelle condizioni di terreno con pH elevato.
La formulazione in microgranuli favorisce una rapida solubilità ed evita la formazione di polvere e grumi difficilmente disperdibili che possono provocare l'occlusione di ugelli e filtri.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Previene e cura la clorosi ferrica, intervenendo in via preventiva e/o alla prima comparsa dei sintomi (ingiallimento delle foglie).
- Intensifica i processi di formazione della clorofilla; per rinverdire le nuove foglie ripetere i trattamenti a distanza di 10-15 giorni.
- L'agente chelante EDDHA permette una buona mobilità nel terreno e un facile assorbimento da parte dell'apparato radicale della pianta.
- Impedisce il disseccamento dei lembi fogliari, la filloptosi e la colatura dei fiori.
- Aumenta la produttività.

MISCIBILITÀ

KIRON 4,8 o-o non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad eccezione dei composti a forte reazione alcalina, degli oli bianchi e dei polisolfuri; tuttavia, è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. Trattare preferibilmente nelle ore più fresche della giornata.

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	**6%**
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA	**4,8%**
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA	**1,2%**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH (sol. 1%)	**7,5**
Solubilità a 20°C	**300 g/L**
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata	**2-11**

FORMULAZIONE

Microgranuli solubili

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

KIRON 4,8 o-o è maggiormente assorbito dalla pianta nelle prime fasi vegetative. Si consiglia, quindi, di intervenire preventivamente alla ripresa vegetativa dei fruttiferi e dopo il trapianto nelle colture orticole e floricole. Nelle colture arboree sono efficaci anche gli interventi a fine ciclo, per far sì che il Ferro venga immagazzinato nei tessuti di riserva prima del periodo della dormienza.

COLTURE	DOSI 100 L ACQUA	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Actinidia	20 g/pianta	Intervenire con assolcatori, o con altri mezzi idonei per la distribuzione al terreno (falcioni e pali iniettori), distribuendo alle singole piante con sintomi di clorosi.
Agrumi	50-100 g/pianta	
Pero	30-50 g/pianta	
Pesco	30-80 g/pianta	
Vite	30-50 g/pianta	
Orticole e Floricole	2-4 g/m^2	
Fertirrigazione	0,05-0,2% (50-200 g/hl)	

40-50 g per pianta

GF0310 8 029816 053101 — CHELATO DI FERRO — ASTUCCIO 20x1 kg — IVA 4%

GF0196 8 029816 051961 — KIRON 4-8 o-o — SACCHETTO 5x5 kg (vendibili singolarmente) — IVA 4%