

ALGREEN®

CONCIME ORGANICO AZOTATO
ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

ALGREEN® è un concime liquido la cui materia prima è stata ottenuta da un estratto selezionato di alghe brune fresche dei generi *Sargassum, Ascophyllum nodosum e Laminaria* mediante una tecnologia di produzione unica e brevettata, la cui caratteristica è di estrarre la soluzione a basse temperature e in ambiente antiossidante.
Questa particolare tecnica permette di trattenere all'interno del formulato le proprietà ormonosimili contenute naturalmente nelle alghe e, pertanto, è particolarmente ricco di auxine, gibberelline, acido alginico, vitamine e antiossidanti naturali.
ALGREEN® ha diverse funzioni: stimola la **crescita della pianta** (Promotore Naturale di Crescita), potenzia i meccanismi di **autodifesa della pianta**, favorisce la ripresa vegetativa, promuove un rapido accrescimento fogliare, induce un'abbondante fioritura e aumenta la pezzatura dei frutti; a livello radicale favorisce la germinazione e la radicazione delle talee.

AVVERTENZE

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose non deve superare i dosaggi minimi riportati in etichetta.

MISCIBILITÀ

Non miscelare con prodotti a base di olio minerale, rame e zolfo. Su varietà di recente introduzione è consigliabile effettuare prove preliminari. Evitare miscele con composti a reazione alcalina e nell'eventualità rispettare una settimana di pausa dopo il trattamento.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	**4%**
Carbonio (C) organico	**10%**
Aminoacidi	
Sostanza organica con peso molecolare nominale ‹ 50 kDa	**30%**
Estratto di Alghe contenente regolatori di crescita naturali e Vitamine	

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH del prodotto tal quale	**6,5-7,5**
Peso specifico a 20°C	**1,25 kg/L**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI TRATTAMENTI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Actinidia	**Fogliare:** 150-200 ml/hl	3 interventi: alla ripresa vegetativa, prefioritura e ingrossamento frutti.
Agrumi		3 interventi: inizio fioritura, caduta petali e ingrossamento frutto.
Fragola		4 interventi: ripresa vegetativa, prefioritura, allegagione, dopo 15 giorni dal precedente.
Vite		5 interventi: germogliamento, pre-fioritura, formazione acini, pre-chiusura grappoli, 30 giorni prima della vendemmia.
Olivo		3 interventi: boccioli fiorali, dopo allegagione, ingrossamento oliva.
POMACEE (Melo, Pero), DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio)		4 interventi: bottoni fiorali, dopo allegagione, ingrossamento frutti, dopo 20 giorni dal precedente.
ORTICOLE (Pomodoro, Patata, Peperone, Cucurbitacee, Carota, Carciofo, Cipolla, ecc.)		3-4 trattamenti a partire da 8-10 giorni dopo il trapianto.
Tappeti erbosi		Iniziare i trattamenti fogliari all'inizio della ripresa vegetativa e continuare ad intervalli di 20-30 giorni.
Floreali ed Ornamentali		Iniziare i trattamenti alle prime fasi vegetative e continuare ad intervalli di 15-20 giorni.
Per trattamenti in FERTIRRIGAZIONE: 3-5 L/ha Eseguire 2-3 trattamenti durante il ciclo colturale: inizio fioritura, piena fioritura, allegagione.		

GF0200 8 029816 052005 TANICA 4x5 L IVA 4%