

BEST® MICROALGHE

BIO

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - FILTRATO DI CREMA D'ALGHE

BEST® MICROALGHE è un biostimolante liquido ottenuto da matrice estrattiva di microalghe appartenenti a diverse specie. La materia prima di comprovata qualità, lavorata con processi di estrazione a freddo, consente di preservare l'elevato contenuto di sostanze naturali bioattive, utili a sostenere lo sviluppo equilibrato e produttivo delle piante.
BEST® MICROALGHE contiene peptidi naturali derivati da microalghe, con distinto peso molecolare, che stimolano l'attività metabolica e regolano le funzioni cellulari della pianta in ogni fase del ciclo produttivo. Questa caratteristica, consente a **BEST® MICROALGHE** di ottimizzare lo sviluppo vegetativo, migliorare l'efficienza nell'utilizzo dei nutrienti (NUE) e rafforzare la risposta della coltura alle principali condizioni di stress.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Favorisce l'attività metabolica della pianta.
- Migliora la resilienza agli stress abiotici.
- Supporta l'efficienza nutrizionale.

MISCIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei mezzi tecnici in commercio, ma è consigliabile effettuare test di compatibilità prima di miscelare **BEST® MICROALGHE** con altri prodotti.
Conservare a temperature comprese tra 4 e 32°C.

COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico	**5,5%**
Mannitolo	**1 g/L**

Contiene tutti gli L-aminoacidi essenziali:
Triptofano, Cisteina, Glutamina, Asparagina, Leucina, Arginina, Valina, Acido glutammico, Acido aspartico, Treonina, Isoleucina, Lisina, Tirosina, Alanina, Fenilalanina, Serina, Istidina, Metionina, Prolina, Glicina e Idrossiprolina.

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

Dose generale: 0,75-1,5 L/ha. Si consiglia di applicare con un adeguato volume di acqua per ottenere una sufficiente bagnatura fogliare.
Per favorire l'allegagione dei frutti: 1-1,5 L/ha in 2-4 applicazioni prima e durante la fioritura.
Per mantenere lo sviluppo vegetativo in condizioni di stress: 2 L/ha con cadenza settimanale.

COLTURE	DOSI TRATTAMENTI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Ortaggi	1-3 L/ha per 4-8 applicazioni	Applicare dopo il trapianto per migliorare la radicazione e ridurre lo stress; durante la fioritura, allegagione e maturazione del frutto. Nel caso di ortaggi a foglia, si consigliano 1-2 applicazioni alla dose di 200 ml/hl (fogliare) al trapianto e dopo 15 giorni.
Frutti	1-3 L/ha per 3-6 applicazioni	Intervenire prima e durante la fioritura, durante l'allegagione e crescita dei frutti.
Estensive ed industriali	1-2 L/ha per 1-2 applicazioni	Applicare nelle fasi di crescita. Una o più con effetto antistress in caso di necessità fino alla dose massima di 3 L/ha.

20-30 ml per 10 L acqua

GF0552	8 029816 055525	FLACONE 12x1 L	IVA 4%
GF0553	8 029816 055532	TANICA 4x5 L	IVA 4%
GF0554	8 029816 055549	TANICA 1x20 L	IVA 4%