

BIOGREEN

COADIUVANTE DELLO SVILUPPO VEGETATIVO IN SOLUZIONE ACQUOSA

BIOGREEN è un bioinduttore naturale di origine vegetale che svolge la sua funzione come attivatore delle funzioni biochimiche dei tessuti vegetali favorendone uno sviluppo equilibrato.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Riequilibrio del metabolismo in seguito a stress idrici e/o termici.
- Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti.
- Migliora l'allegagione.
- Anticipa e uniforma l'epoca di maturazione.
- Aumenta il contenuto in zuccheri.
- Favorisce la conservabilità dei frutti.
- Induce una fioritura uniforme e rigogliosa.
- Potenzia l'assorbimento e l'efficacia dei concimi a cui viene associato.

MISCIBILITÀ

BIOGREEN è miscibile con i mezzi tecnici (a reazione neutra) normalmente utilizzati per la difesa delle colture. L'associazione con HYDRA (NPK 20-20-20 e microelementi chelati) assicura un adeguato supporto nutrizionale all'azione stimolante.

COMPOSIZIONE

Aminoacidi vegetali	**10-13%**
Acidi umici	**4-6%**
Zuccheri liberi c.a.	**4%**
Acqua q.b.	**100%**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH (sol. 1%)	**6,9**
Peso specifico a 20°C	**1,21 kg/L**
Conducibilità elettrica a 20°C (0,1%)	**0,35 mS/cm**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

È consigliata l'applicazione per via fogliare nei periodi di maggior necessità della coltura.
Eseguire la distribuzione in modo accurato al fine di assicurare una uniforme copertura della vegetazione ed evitare sgocciolamenti.

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Vite	1-3 kg/ha N. applicazioni: 3	Ripresa vegetativa - Allegagione - Pre-chiusura dei grappoli.
Agrumi		Ripresa vegetativa - Pre-fioritura - Fine allegagione.
Olivo		Pre-fioritura - Allegagione - Indurimento dei noccioli.
Pomacee, Drupacee, Actinidia		Pre-fioritura - Allegagione - Accrescimento dei frutti.
Pomodoro, Peperone, Melanzana		Al 1° palco fiorale - Altri 2 interventi a distanza di 15 giorni.
Fragola, Melone, Anguria, Zucchino		Pre-fioritura - Altri 2 interventi a distanza di 15 giorni.
Patata		Da inizio sviluppo dei tuberi ogni 15 giorni.
Carciofo		Dalla formazione dei capolini ogni 15 giorni.
Fagiolo, Fagiolino, Pisello		Ogni 15 giorni dalla fase dei bottoni fiorali.
Ortaggi a foglia		A distanza di 20 giorni.
Erba medica		Pre-fioritura - Allegagione per le coltivazioni destinate alla produzione di seme.
Floreali e Ornamentali		A distanza di 15-20 giorni dalla ripresa vegetativa e/o sviluppo vegetativo.

GF0501	8 029816 055013	FLACONE	12x1 L	IVA 22%	
GF0445	8 029816 054450	TANICA	4x3 L	IVA 22%	