

Titolare dell'autorizzazione: VEXTACHEM s.r.l

FLEXONE

REGOLATORE DI CRESCITA PER IL KIWI E UVA DA TAVOLA

FLEXONE è un regolatore di crescita il cui principio attivo appartiene al gruppo delle citochinine che, stimolando la moltiplicazione e la distensione cellulare, è in grado di incrementare le dimensioni del kiwi e degli acini d'uva uniformandone la pezzatura e conservando tutte le caratteristiche qualitative.
FLEXONE incrementa ed uniforma il calibro dei frutti agendo principalmente sull'aumento della sostanza secca, e non tramite un maggior accumulo di acqua. Per questo motivo i frutti trattati seguendo i consigli applicativi di seguito esposti, presentano valori migliorativi in termini di conservabilità, grado zuccherino, concentrazione di solidi solubili e contenuto di sostanza secca, soddisfacendo così tutte le esigenze del mercato. La formulazione come concentrato emulsionabile è frutto di attente ricerche ed è garanzia di elevata e costante efficacia del prodotto.

CONSIGLI GENERALI DI TECNICA APPLICATIVA

- **FLEXONE** non svolge attività sistemica e quindi la miscela deve essere applicata direttamente sulla parte da trattare avendo cura di bagnarla uniformemente.
- Applicare **FLEXONE** in **1 solo trattamento** avendo cura di bagnare in maniera uniforme tutti i frutti / grappoli (dimensione delle gocce 100-200 µm).
- Applicazioni eccessivamente tardive e dosaggio superiori potrebbero ridurre la conservabilità del frutto.
- Evitare il trattamento nelle ore più calde.
- Evitare l'applicazione con pericolo di pioggia imminente.
- **Non miscelare FLEXONE con altri prodotti.**
- Evitare ruscellamento e gocciolamento sulle parti trattate.



PERICOLO
H225 - H315 - H319
H412 - EUH401

COMPOSIZIONE

Forchlorfenuron	**0,92% (7,5 g/L)**
Coformulanti	**q.b. a 100**
Contiene etanolo	

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (EC)

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURA	VARIETÀ	PERIODO APPLICATIVO	DOSE (L/ha)	VOLUME D'ACQUA (L/ha)	CONCENTRAZIONE (g sostanza attiva /ha)	INTERVALLO SICUREZZA
Kiwi		Circa 3 settimane dopo la piena fioritura (su frutti con dimensione simile ad una noce)	APPLICAZIONE GENERALIZZATA (ATOMIZZATORI)			50 giorni
			1-1,3	1.000	7,5-9,75	
			0,8-1	750	6-7,5	
			APPLICAZIONE LOCALIZZATA (LANCIA O ATOMIZZATORI SPECIALI)			
			0,6-0,8	600	4,5-6	
			0,4-0,5	400	3-3,75	
Uva da tavola	varietà Italia	acini 10-12 mm	APPLICAZIONE GENERALIZZATA (ATOMIZZATORI)			50 giorni
	tutte le altre	acini 6-8 mm				
			1-1,3	1.000	7,5-9,75	
			0,7-1	750	5,25-7,5	

Su **KIWI**, al fine di ottenere il massimo risultato è importante adeguare il carico dei frutti, la nutrizione e l'irrigazione delle piante.
Per evitare forme non regolari dei frutti di Kiwi, **FLEXONE deve essere applicato esclusivamente su frutti ben impollinati e non prima di 3 settimane dopo la piena fioritura.**

Su **UVA DA TAVOLA**, per evitare l'accentuarsi dell'indesiderato fenomeno dell'acinellatura, **effettuare il trattamento non prima della completa cascola naturale degli acini non allegati.**
Prima di trattare con **FLEXONE**, se necessario, ridurre il numero di acini/grappolo ed adeguare la nutrizione e l'irrigazione delle piante.
L'applicazione del prodotto su Uva da tavola può indurre leggeri ritardi di colorazione e/o di maturazione del grappolo.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GF0549 8 029816 055495 FLACONE 12x1 L IVA 10%