FLOBOND™ DI2010

POLIACRILAMMIDE ANIONICA IN SOLUZIONE ACQUOSA



FLOBOND™ DI2010 é un prodotto unico, volto a migliorare le dinamiche di infiltrazione dell'acqua nel terreno, preservandone la conduttività idraulica e dunque migliorando la disponibilità idrica complessiva del suolo. Proteggendo la struttura del terreno, **FLOBOND™ DI2010** consente di limitare la perdita di acqua e di fertilizzanti nei terreni leggeri dovuta alla percolazione; mentre nei terreni pesanti di ridurre il tempo necessario per la bagnatura uniforme della zona radicale.
Si consiglia l'impiego di **FLOBOND™ DI2010** nei periodi chiave della coltivazione come radicazione, fioritura, ed allegagione nonchè in situazioni di **caldo intenso e scarsa disponibilità idrica**. L'applicazione di **FLOBOND™ DI2010** fin dalla prima acqua di irrigazione favorirà una **gestione idrica ottimale** durante tutto il ciclo colturale.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Favorisce una gestione idrica efficiente in suoli leggeri.
- Migliora le caratteristiche tecniche del suolo.
- Supporta l'efficienza nutrizionale.

MISCIBILITÀ

É compatibile con la maggior parte dei mezzi tecnici presenti in commercio.
Se conservato in condizioni idonee (5-30°C) può essere utilizzato e conservato per 24 mesi.

COMPOSIZIONE

Copolimero (Prop-2-enamide, acido prop-2-enoico)	**28 % p/p**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH	**4,5**
Densità	**1,1g/ml**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI TRATTAMENTI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Alberi da frutto e vite	10 L/ha per 3-5 applicazioni	Da ripresa vegetativa a fioritura, allegagione fino a maturazione del frutto. **Per nuovi impianti intervenire prontamente a messa dimora** ed in successione ogni 15/20 giorni fino ad attecchimento.
Orticole	5 L/ha per 3-5 applicazioni	Intervenire al trapianto o in fase di semina e successivamente a distanza di 15 giorni. Ripetere il trattamento in caso di lavorazioni del terreno. Nel caso di una **coltura a ciclo breve, si consiglia una singola applicazione alla dose di 8-10 L/ha dopo la lavorazione del terreno.**
Cereali e semi oleosi	5-10 L/ha per 2 applicazioni	Si conglia l'applicazione alla semina o in concomitanza con altri trattamenti fitosanitari.

FLOBOND™ DI2010 può essere utilizzato secondo necessità e in funzione dell'andamento stagionale. Si consigliano applicazioni preventive nei periodi caratterizzati da temperature elevate e aumentata evaporazione. Ripetere il trattamento secondo necessità in funzione della classe di tessitura del suolo.

GF0550	8 029816 055501	TANICA	1x10 L	IVA 4%	GF0555	8 029816 055556	TANICA	1x25 L	IVA 4%