

FLOBOND™ LX50

POLIACRILAMMIDE ANIONICA IN SOLUZIONE ACQUOSA

FLOBOND™ LX50 è un prodotto liquido per applicazione radicale progettato per ridurre lo stress e le carenze nelle colture coltivate in suoli ad alta salinità. **FLOBOND™ LX50** aumenta la quantità di sali eliminati per lisciviazione, riducendo così la conducibilità elettrica del terreno nella zona in prossimità delle radici. L'equilibrio osmotico tra il terreno e la pianta viene riequilibrato, l'acqua e i minerali tornano nuovamente a disposizione dell'apparato radicale. Le carenze e la clorosi scompaiono, così il vigore e la resa della cultura migliorano notevolmente. **FLOBOND™ LX50** è compatibile con tutti i sistemi di irrigazione e fertirrigazione. **FLOBOND™ LX50** può essere impiegato in qualsiasi momento per contrastare i problemi di salinità del terreno che ostacolano l'assorbimento di acqua e nutrienti. Applicare durante i momenti di maggiore attività metabolica, per garantire resa e qualità della produzione.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Abbatte la salinità nei terreni intensamente coltivati.
- Migliora le caratteristiche tecniche del suolo.
- Supporta l'efficienza nutrizionale.

MISCIBILITÀ

Da applicarsi all'inizio dell'irrigazione, separatamente dai fertilizzanti, per liberare il terreno dai sali in eccesso. Se conservato in condizioni idonee (5-30° C) può essere utilizzato e conservato per 24 mesi.

COMPOSIZIONE

Omopolimero
(acido prop-2-enoico)

50% p/p

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH	**2,5-3,5**
Densità	**1,2 g/ml**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI TRATTAMENTI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Alberi da frutto e vite	10 L/ha per 3-5 applicazioni	Da ripresa vegetativa a fioritura, allegagione fino a maturazione del frutto. **Per nuovi impianti intervenire prontamente a messa dimora** ed in successione ogni 15/20 giorni fino ad attecchimento.
Orticole	5 L/ha per 3-5 applicazioni	Intervenire al trapianto o in fase di semina e successivamente a distanza di 15 giorni. Nel caso di una **coltura a ciclo breve, si consiglia una singola applicazione alla dose di 8-10 L/ha in base al valore di salinità rilevata.**
Cereali e semi oleosi	5-10 L/ha per 2 applicazioni	Si conglia l'applicazione alla semina o in concomitanza con altri trattamenti fitosanitari.

FLOBOND™ LX50 può essere utilizzato secondo necessità e come parte di un programma di nutrizione per prevenire il rischio di accumulo di sale nello strato superiore del terreno specialmente quando la salinità risulta essere un problema noto nella zona.

GF0551 8 029816 055518 TANICA 1x10 L IVA 4%

GF0556 8 029816 055563 TANICA 1x25 L IVA 4%