

HYDRA PK

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI PK (SO_3) 32-40 (15) CON MICROELEMENTI

HYDRA PK è un concime in polvere microcristallina idrosolubile utilizzabile per applicazione fogliare ma anche in fertirrigazione, dotato di elevata assimilabilità ed efficacia nutrizionale. La peculiare composizione ad alta concentrazione di Fosforo e Potassio a reazione sub-acida favorisce la **ramificazione dell'apparato radicale**, utile nelle fasi di post-trapianto e ripresa vegetativa. L'applicazione di **HYDRA PK** in pre-fioritura predispone all'emissione di fiori fertili e contiene gli eccessi di vigoria controproducenti per il raggiungimento di elevate produzioni commerciabili. **L'impiego su frutti già sviluppati** in fase di invaiatura permette il raggiungimento di pezzatura superiore, consistenza e contenuto zuccherino. Le applicazioni fogliari e radicali in post-raccolta o prima del riposo vegetativo su olivo, vite e drupacee favoriscono la lignificazione di tralci e rami a frutto migliorando la resistenza al freddo, la quantità di gemme fertili e la produzione dell'anno successivo. Infine, l'utilizzo su mais e cereali permette di contenere rapidamente i danni da carenza di Fosforo e basse temperature nella fase di post-emergenza e accestimento favorendo un rapido recupero della crescita delle piante.

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile	**32%**
Ossido di Potassio (K_2O) idrosolubile	**40%**
Anidride solforica (SO_3) idrosolubile	**15%**
Boro (B) ossiacido idrosolubile	**0,01%**
Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile	**0,006%**
Ferro (Fe) chelato con EDTA idrosolubile	**0,05%**
Manganese (Mn) chelato con EDTA idrosolubile	**0,02%**
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	**0,004%**
Zinco (Zn) chelato con EDTA idrosolubile	**0,008%**
Agente chelante	**EDTA**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata **4-7,5**

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina idrosolubile

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Vite da vino e da tavola	250 g/hl	A inizio invaiatura e dopo 14 gg. In post-raccolta o caduta foglie.
Agrumi	250-300 g/hl	Pre-fioritura e inizio invaiatura.
Olivo	250-500 g/hl	Pre-fioritura, invaiatura drupe e post-raccolta.
Drupacee e Pomacee	250 g/hl	Inizio invaiatura frutto e post-raccolta.
Actinidia	250-300 g/hl	Ingrossamento frutto e post-raccolta.
Fragola	200-250 g/hl	Pre-fioritura e invaiatura.
Orticole in pieno campo	250-300 g/hl	Pre-fioritura e maturazione frutto e foglie.
Orticole in serra	100-150 g/hl	Pre-fioritura e ingrossamento frutto.

GF0424 8 029816 054245 BUSTA 10x2,5 kg IVA 4%

GF0439 8 029816 054399 SACCO 1x25 kg IVA 4%