

LARTH® Ca-Mg

SOLUZIONE DI NITRATO DI CALCIO (Mg 4) PER FERTIRRIGAZIONE

LARTH® Ca-Mg è un concime appositamente studiato per applicazioni in fertirrigazione, a pieno campo, in serra ed in idroponica. La specifica formulazione liquida e la purezza dei componenti garantiscono facilità di utilizzo, praticità nei dosaggi e rapido assorbimento radicale del calcio.
LARTH® Ca-Mg è un prodotto ad elevato contenuto di calcio e magnesio indicato per prevenire in fertirrigazione fisiopatie quali: marciume apicale e seccume delle foglie basali del pomodoro; seccume fisiologico del melone; seccume dei margini fogliari (tip burn) della lattuga; seccumi fogliari di melanzana, peperone ed altri ortaggi; disseccamento del rachide della vite; butteratura amara del melo; spaccatura dei frutti (cherry cracking).
La presenza di magnesio stimola la formazione di clorofilla con conseguente aumento dell'attività fotosintetica che si traduce in una colorazione più intensa di foglie e frutti e in un incremento della produttività complessiva della pianta.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Apporti costanti di **LARTH® Ca-Mg** consentono di ottenere produzioni qualitativamente superiori, con una maggiore consistenza e conservabilità dei frutti.
- **LARTH® Ca-Mg** è indicato in post-trapianto per nutrire il terreno in vicinanza delle radici delle piantine e determinare un rapido superamento della crisi di trapianto.

MISCIBILITÀ

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose non deve superare i **150 g/hl (0,15%)**.
Le applicazioni vanno effettuate di norma nelle ore più fresche della giornata.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	**8%**
Azoto (N) nitrico	**8%**
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	**10%**
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua	**4%**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH del prodotto tal quale (20°C)	**2,5**
Peso specifico (20°C)	**1,49 kg/L**
Conducibilità elettrica a 25°C (1%)	**6,5 mS/cm**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSE PER CICLO COLTURALE	MODALITÀ DI UTILIZZO
Pomodoro, Melone, Melanzana	10-30 L/ha	**Fertirrigazione:** in post-trapianto, post-allegagione e ingrossamento bacche.
Indivia, Lattuga, Scarola	15-20 L/ha	**Fertirrigazione:** in pre-chiusura file e dopo 8-10 giorni.
Sedano, Finocchio	15-20 L/ha	**Fertirrigazione:** dalla 4a-5a foglia vera ogni 10-20 giorni.
Uva da tavola	20-40 L/ha	**Fertirrigazione:** 3 interventi a risveglio vegetativo, post-allegagione e ingrossamento acino.
Altre colture	10-30 L/ha	
Piante ornamentali e da fiore	10-20 L/ha	**Fertirrigazione:** minimo 4 applicazioni a partire dalle fasi vegetative centrali.
Idroponia	Utilizzare 1-2 L ogni 100 litri di soluzione madre. Tali dosaggi sono da variare in funzione delle esigenze colturali e del tipo di acqua utilizzata. N.B.: non miscelare il formulato con prodotti contenenti Fosforo e Zolfo.	

ATTENZIONE:
H318

GF0544 8 029816 055440 TANICA 1x20 L IVA 4%