

MEDAPROGRAMMATI F2 | BEST ALBERI DA FRUTTO

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI CHELATI (Fe-Mn-Zn) + CALCIO E MAGNESIO (Ca-Mg) (4-8)

F2 è un prodotto studiato appositamente per la correzione dei rapporti K/Ca e K/(Ca+Mg), come prevenzione o correzione di eventuali squilibri all'interno della pianta che, possono causare gravi disordini fisiologici.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Aiuta a prevenire il disseccamento del rachide in viticoltura e la butteratura amara su melo.
- Determina un miglioramento qualitativo e quantitativo.

AVVERTENZE

F2 non è compatibile con formulati a reazione prettamente acida o alcalina. Considerato il gran numero di specie e varietà, nonché le differenti condizioni ambientali, è sempre consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.



PERICOLO:
H290 - H361D - H302 H315 - H318 - H412

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	**4%**
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua	**8%**
Ferro (Fe) solubile in acqua	**0,7%**
Ferro (Fe) chelato con DTPA	**0,7%**
Manganese (Mn) solubile in acqua	**1%**
Manganese (Mn) chelato con DTPA	**1%**
Zinco (Zn) solubile in acqua	**0,5%**
Zinco (Zn) chelato con DTPA	**0,5%**
Agente chelante	**DTPA**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH del prodotto tal quale (20°C)	**5,8**
Peso specifico a 20°C	**1,42 kg/L**
Conducibilità elettrica a 25°C (0,3%)	**3,34 mS/cm**
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata	**4-8**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI
Vite	Disseccamento del rachide e miglioramento qualitativo. **F2** alla dose di **300-500 ml/hl** associato ai normali trattamenti di difesa a partire dalla fioritura, assicura miglioramenti qualitativi sia su uva da tavola che su uva da vino.
Melo	Miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione, riduzione della butteratura e riduzione della filloptosi su Golden Delicius. Per varietà e zone soggette ad attacchi di "butteratura amara" medio-leggeri, si consigliano 3-4 trattamenti di **F2** alla dose di **300 ml/hl** iniziando ai primi di giugno; per varietà e zone fortemente soggette, si consigliano 3-4 trattamenti alla dose di **350-400 ml/hl** iniziando in post-allegagione. Numerose prove ed applicazioni in campo evidenziano la validità di **F2** anche nel contenimento della filloptosi con risultati che arrivano anche all'80% di riduzione. **F2** si applica sul melo in miscela con la normale difesa fitosanitaria iniziando in post-fioritura. N.B.: non miscelare **F2** con prodotti fitosanitari che favoriscono la filloptosi.
Pero	**F2** viene applicato su pero, specialmente su Decana per incrementare l'allegagione e migliorare la pezzatura. Conference, per favorire lo sviluppo vegetativo e la pezzatura della frutta. Abate, per ridurre il fenomeno dell'alternanza e favorire una migliore allegagione. Suggeriamo applicazioni in miscela con trattamenti fitosanitari ad inizio fioritura usando dosi di **300-400 ml/hl** per volume normale, fino ad **1 L/hl** per basso volume.
Pesco	**F2** applicato a partire da bottoni rosa, alla dose di **300-400 ml/hl**, migliora sia la pezzatura che la colorazione del frutto.
Pomodoro	Per prevenire il "marciume apicale" impiegare **300 ml/hl** per 3-5 trattamenti iniziando quando il pomodoro del primo palco inizia l'invaiatura.

30-40 ml / 10 L di acqua
300-400 ml / 100 L di acqua

GH0459	8 029816 054597	BEST ALBERI DA FRUTTO	12x1 kg	IVA 4%
GF0317	8 029816 053170	MEDAPROGRAMMATI F2 FLACONE	12x1 kg	IVA 4%
GF0370	8 029816 053705	MEDAPROGRAMMATI F2 TANICA	4x5 kg	IVA 4%
GF0384	8 029816 053842	MEDAPROGRAMMATI F2 TANICA	1x10 kg	IVA 4%