

MEDAPROGRAMMATI F3 | BEST POMODORO

CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI - SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO CON BORO (B), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn) E ZINCO (Zn)

F3 è particolarmente indicato per prevenire il "marciume apicale" del pomodoro mediante l'apporto sia di calcio sia di microelementi che offrono una nutrizione ottimale alla pianta. Le piante trattate presentano vegetazione più verde con foglie più consistenti e più resistenti. L'effetto correttivo non dipende tanto dal contenuto in calcio del prodotto, quanto dalla capacità della pianta di assorbirlo ed immagazzinarlo nei frutti. Il formulato offre calcio mobile e disponibile per l'assorbimento da parte della pianta.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Aumenta la pezzatura e la consistenza dei frutti.
- Aiuta a prevenire il "marciume apicale" del pomodoro.

MISCIBILITÀ

F3 è perfettamente miscibile con i comuni mezzi tecnici usati durante i periodi sopra descritti. Evitare miscele con prodotti prettamente acidi od alcalini.

AVVERTENZE

F3 non è compatibile con formulati a reazione prettamente acida o alcalina. Considerato il gran numero di specie e varietà, nonché le differenti condizioni ambientali, è sempre consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	**15%**
Boro (B) solubile in acqua	**0,05%**
Ferro (Fe) chelato con DTPA	**0,04%**
Manganese (Mn) chelato con DTPA	**0,1%**
Zinco (Zn) chelato con DTPA	**0,01%**
Agente chelante	**DTPA**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH del prodotto tal quale (20°C)	**6**
Peso specifico a 20°C	**1,35 kg/L**
Conducibilità elettrica a 25°C (0,3%)	**2,87 mS/cm**
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata	**3-9**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI
Melo, Pero	Per prevenire la "butteratura amara" su melo, la sequenza dei trattamenti sarà da intendersi a seconda della sensibilità della varietà stessa. Per varietà e zone soggette ad incidenza medio-leggera si consigliano 3-4 trattamenti con **F3** alla dose di **300 ml/hl** iniziando dai primi di luglio fino alla pre-raccolta. Per varietà e zone fortemente soggette al fenomeno della butteratura amara si consigliano 5-6 trattamenti con **F3** alla dose di **300 ml/hl** iniziando da metà giugno fino alla raccolta. RUGGINOSITÀ: nessun problema di ruggine è stato osservato nelle prove e nelle applicazioni pratiche.
Pomodoro	Per prevenire il "marciume apicale" impiegare **300 ml/hl** per 3-5 trattamenti iniziando quando il pomodoro del primo palco inizia l'invaiatura.
Orticoltura e Floricoltura	Per ottenere piante ben sviluppate e fioriture ricche e prolungate, impiegare **200-300 ml/hl**.

ATTENZIONE: H319

20-30 ml / 10 L di acqua

GH0260	8 029816 052609	BEST POMODORO	FLACONE 12x500 g	IVA 4%
GF0371	8 029962 053710	MEDAPROGRAMMATI F3	TANICA 4x5 kg	IVA 4%
GF0296IT	8 029816 052968	MEDAPROGRAMMATI F3	FLACONE 12x1 kg	IVA 4%
GF0386	8 029816 053866	MEDAPROGRAMMATI F3	TANICA 1x10 kg	IVA 4%