

MEDAPROGRAMMATI F4 | BEST AGRUMI

MISCELA DI MICROELEMENTI RAME (CU), MANGANESE (MN) E ZINCO (ZN)

L'applicazione di **F4** è consigliata principalmente in primavera, quando durante le prime fasi di sviluppo delle piante, si manifestano le carenze di Zinco e Manganese, causate da terreni freddi, asfittici e della scarsa capacità di assorbimento dell'apparato radicale.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Favorisce l'allegagione.
- Riduce la cascola dei frutti.
- Incrementa la formazione degli organi riproduttivi, con conseguente aumento della produzione.

AVVERTENZE

F4 non è compatibile con formulati a reazione prettamente acida o alcalina. Considerato il gran numero di specie e varietà, nonché le differenti condizioni ambientali, è sempre consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.



PERICOLO:
H318 - H411

20-30 ml / 10 L di acqua

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) chelato con DTPA	**0,1%**
Manganese (Mn) chelato con DTPA	**2%**
Zinco (Zn) solubile in acqua	**4%**
Zinco (Zn) chelato con DTPA	**0,2%**
Agente chelante	**DTPA**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH del prodotto tal quale (20°C)	**5,5**
Peso specifico a 20°C	**1,2 kg/L**
Conducibilità elettrica a 25°C (0,3%)	**2,95 mS/cm**
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata	**3-9**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI
POMACEE (Melo, Pero)	Su pomacee, la carenza si manifesta con foglioline piccole e allungate che formano rosette striminzite e poco sviluppate. Modalità di intervento: effettuare 2/3 trattamenti con **F4** alla dose di **300-400 ml/hl** dalla fase di "orecchiette di topo" alla fioritura; in caso di necessità può essere miscelato con **F1**. In caso di applicazione a basso volume di acqua si sconsiglia di superare la dose di **1 L/hl.** In caso di gravi carenze nutrizionali si raccomanda di eseguire dei trattamenti nel periodo estivo-autunnale per preparare maggiormente le piante alla primavera successiva.
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino)	Su drupacee, l'applicazione di **F4** contro carenze evidenti inizia circa 3 settimane dopo la fioritura, con 3-4 trattamenti alla dose di **300 ml/hl**, fino a un massimo di 1 litro per trattamenti a basso volume. In caso di carenze di media entità, si consigliano trattamenti alternati di **F4** e **F2**.
Agrumi	Gli agrumi sono particolarmente sensibili a carenze di Zn e Mn, e rispondono bene alle applicazioni di **F4** in particolare durante la fase di accrescimento e di rinnovo dell'apparato fogliare. Intervenire con **F4** alla dose di **300 ml/hl** con intervalli fra i trattamenti di circa 2 settimane con un minimo di 3/4 trattamenti.
Colture industriali	Su colture industriali come il MAIS si consiglia sempre un trattamento preventivo in caso di semine anticipate. Ottimi risultati si ottengono applicando **F4** in miscela con il diserbo di post emergenza, alla dose di **1 L/ha**. Essendo la formula di **F4** particolarmente ricca in sostanza organica-igroscopica, favorirà lo sviluppo di foglie elastiche e dal verde intenso. I frutti si presenteranno consistenti e ben colorati.

GH0258 8 029816 052586 **BEST AGRUMI** FLACONE 12x500 g IVA 4%

GF0372 8 029962 053727 **MEDAPROGRAMMATI F4** FLACONE 12x1 kg IVA 4%