

MEDAPROGRAMMATI F5 | BEST OLIVO

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI - BORO ETANOLAMMINA

F5 è un prodotto specifico contro le boro carenze che si manifestano particolarmente nella prima fase vegetativa. Il boro è un elemento estremamente solubile, scarsamente legato ai colloidi del terreno, e pertanto si consiglia l'applicazione fogliare durante le fasi più critiche. **F5** incrementa l'allegagione e lo sviluppo dei frutti di alta qualità.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Grazie alla presenza del boro, migliora la fertilità del polline.
- Aumenta il numero dei frutti allegati.
- Incrementa la produzione.

AVVERTENZE

F5 non è compatibile con formulati a reazione prettamente acida o alcalina. Considerato il gran numero di specie e varietà, nonché le differenti condizioni ambientali, è sempre consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.

20-30 ml / 10 L di acqua
200-300 ml / 100 L di acqua

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua	**8%**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH del prodotto tal quale (20°C)	**8,4**
Peso specifico a 20°C	**1,29 kg/L**
Conducibilità elettrica a 25°C (0,3%)	**1,05 mS/cm**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI
Olivo	**Fogliare: F5** si applica in concomitanza con i trattamenti fitosanitari, per migliorarne l'efficacia e aiutare la pianta a superare gli stress idrici. Utilizzare alla dose di **200-300 ml/hl** in due interventi: il primo in pre-fioritura, il secondo in post-allegagione.
Frutticoltura e Orticoltura	**Fogliare: F5** si impiega da pre-fioritura ad inizio allegagione per 2-3 trattamenti, alla dose di 200-300 ml/hl per: migliorare la maturazione del polline e la formazione dei semi; stimolare la moltiplicazione cellulare; incrementare l'allegagione e lo sviluppo del frutto.
Vite	**Fogliare:** la sensibilità alla borocarenza non è identica in tutte le varietà ed è inoltre legata alle situazioni pedo-climatiche. La carenza si manifesta in generale con crescita primaverile stentata e spiccata acinellatura. **F5** si applica in miscela con prodotti antiperonosporici alla dose di **200-300 ml/hl** nella fase prefiorale; 2-3 trattamenti intervallati di 10-15 giorni sono normalmente sufficienti per curare la carenza.
Barbabietola da zucchero, Cavolfiore	**Fogliare:** questa famiglia di piante è estremamente sensibile a boro carenze che si manifestano con il classico "cuore nero". La carenza si manifesta particolarmente in suoli a pH elevato, in concomitanza di forti dilavamenti o persistente siccità causando la morte dei tessuti terminali. Due applicazioni alla dose di **1,5-2 L/ha** sono normalmente sufficienti per ottenere buoni risultati.
Erba medica	**Fogliare:** è particolarmente sensibile a boro carenze, che si manifestano con la parte terminale della pianta di colore giallo. Due applicazioni di **F5** alla dose di **1,5-2 L/ha** durante la prima fase di accrescimento, aumentano notevolmente quantità e qualità di produzione.

	8 029962 053611	BEST OLIVO	12x1 kg	IVA 4%
GF0374	8 029962 053741	MEDAPROGRAMMATI F5 TANICA	4x5 kg	IVA 4%
GF0295IT	8 029816 052951	MEDAPROGRAMMATI F5 FLACONE	12x1 kg	IVA 4%