

MEDAPROGRAMMATI F6 | BEST RINVERDENTE

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI FERRO (FE) DTPA

F6 è un concime composto da ferro, elemento essenziale per la formazione della clorofilla, chelato e sospeso in una soluzione organica, per garantire l'ottima assorbibilità. **F6** previene e cura efficacemente ogni tipo di clorosi ferrica.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Cura e previene le fisiopatie causate da carenza di ferro.
- Consente di intervenire con trattamenti fogliari quando non si possono effettuare interventi al terreno.
- Permette una più veloce ripresa delle piante in grave stato di carenza.

AVVERTENZE

F6 non è compatibile con formulati a reazione prettamente acida o alcalina. Considerato il gran numero di specie e varietà, nonché le differenti condizioni ambientali, è sempre consigliabile effettuare saggi d'impiego preliminari.

20-30 ml / 10 L di acqua
200-300 ml / 100 L di acqua

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	**4%**
Ferro (Fe) chelato con DTPA	**4%**
Agente chelante	**DTPA**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH del prodotto tal quale (20°C)	**5,2**
Peso specifico a 20°C	**1,28 kg/L**
Conducibilità elettrica a 25°C (0,3%)	**1,16 mS/cm**
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata	**3-9**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI
Frutticoltura (Melo, Pero, Pesco e altre frutticole)	**Fogliare:** iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi alla dose di **200-300 ml/hl,** eseguendo minimo 2-3 trattamenti a distanza di 10-15 giorni. Su varietà sensibili a ruggine non impiegare il prodotto durante le fasi fenologiche più sensibili.
Vite	**Fogliare:** su vigneti che tradizionalmente mostrano sintomi da clorosi ferrica è buona pratica iniziare i trattamenti in concomitanza con l'inizio della difesa antiperonosporica. Questo permette di arrivare alla fioritura in condizioni ottimali, senza necessità di interventi in fioritura e post-fioritura. **F6**, applicato alla dose di **300 ml/hl** per 3-4 trattamenti, a distanza di 10-15 giorni, è normalmente sufficiente a risolvere la carenza.
Actinidia	**Fogliare:** questa coltura risulta particolarmente sensibile a carenze di ferro e reagisce con crescita stentata e produzioni di scarsa quantità e qualità. Impiegando **F6** per 3-4 applicazioni, alla dose di **300 ml/hl**, iniziando quando la pianta è allo stadio di 3a-4a foglia e mantenendo un intervallo fra i trattamenti di 10-15 giorni, si arriverà alla fioritura con piante ben nutrite, in grado di garantire un'ottima allegagione e fruttificazione.
Orticoltura e Floricoltura	**Fogliare: F6** è il prodotto ideale per curare carenze di ferro su varie colture orticole e floricole e può comodamente essere miscelato ai normali prodotti per la difesa. Si consiglia di non superare la dose di **300 ml/hl**, di non trattare fiori con petali delicati in fioritura, di iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi. Sfruttare le ore più fresche per l'applicazione.
Tappeti erbosi e campi da golf	**Fogliare:** su tappeti erbosi **F6** esercita un'azione tonificante e rinverdente. Per interventi preventivi: **300-400 ml/hl;** per interventi curativi: **500-600 ml/hl.** Evitare il contatto del prodotto su marciapiedi, superfici in pietra o cemento.

GH0418	8 029816 054818	BEST RINVERDENTE	FLACONE 12x1 kg	IVA 4%
GF0375	8 029816 053750	MEDAPROGRAMMATI F6	TANICA 4x5 kg	IVA 4%
GF0297IT	8 029816 052975	MEDAPROGRAMMATI F6	FLACONE 12x1 kg	IVA 4%