NU-GIB TB

FITOREGOLATORE A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO IN COMPRESSE



NU-GIB TB è un fitoregolatore di crescita a base di una sostanza vegetale naturale (Acido Gibberellico) che influenza molti processi biologici delle piante: sviluppo, fioritura, anticipo della produzione.
Questa sostanza somministrata alle piante in determinati momenti e dosi produce effetti positivi ai fini desiderati (allegagione, precocità).

NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO

- Aggiungere sempre **50 ml/hl di un BAGNANTE**, avendo cura di metterlo prima di **NU-GIB TB**.
- Il prodotto deve essere impiegato in giornate di tempo buono e stabile (evitare l'impiego quando si prevedono piogge imminenti).
- Applicare la miscela subito dopo la sua preparazione e comunque entro le 24 ore successive.
- Trattare preferibilmente nelle ore più fresche del giorno, con temperature non inferiori a 7°C o superiori a 32°C.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, per migliorare la copertura sulla vegetazione e di conseguenza l'assorbimento del prodotto da parte delle piante.

COMPATIBILITÀ

NU-GIB TB non è compatibile con prodotti a reazione alcalina. Tuttavia, considerate le numerose colture sulle quali è impiegabile il prodotto e le variabili miscele con altri prodotti si raccomandano test preventivi prima di utilizzare il **NU-GIB TB** in miscela con altri formulati su vasta scala.

ATTENZIONE: H319

FITOTOSSICITÀ

Con il variare delle condizioni ambientali, dello stadio fenologico delle piante e delle diverse varietà si possono ottenere risultati molto diversi. Si consiglia perciò di effettuare test su piccole superfici, applicando le dosi più basse sulle varietà mai trattate prima di effettuare interventi su superfici più ampie. Acclarare localmente le tecniche d'impiego.

Titolare dell'autorizzazione: Nufarm Italia S.r.l.
Registrazione Ministero Salute
n. 14179 del 18/03/2008

COMPOSIZIONE

Acido gibberellico puro **20 g**
(1 compressa contiene 1 g di p.a. puro)

INTERVALLO DI SICUREZZA

20 giorni per tutte le Colture

FORMULAZIONE

Compresse effervescenti solubili in acqua

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Pero	1-2 compresse/hl	**Per favorire la partenocarpia e stimolare lo sviluppo della fruttificazione normale**, si deve trattare nel periodo compreso fra l'inizio (20-30%) di fiori aperti e la piena fioritura, impiegando non meno di 10 hl/ha di soluzione.
Arancio	2-4 compresse/hl	**Per avere la buccia liscia e un ritardo di maturazione** sulle varietà Moro, Tarocco e Sanguinella, trattare poco prima della colorazione dei frutti avendo cura di bagnare abbondantemente.
Clementine, Mandarino	1-2 compresse/hl	**Per favorire l'allegagione** trattare quando la maggior parte dei fiori è in piena fioritura o inizia a perdere petali.
Limone	1-2 compresse/hl	**Per aumentare colore e pezzatura dei frutti e per uniformare le raccolte** trattare circa 5-7 settimane prima della prima raccolta e con il colore della maggioranza dei frutti che comincia a virare al giallo-argenteo.
Carciofo	1-2 compresse/hl	**Per anticipare la produzione**, trattare al momento in cui si nota la formazione delle infiorescenze.
Fragola in coltura protetta	2-3 compresse/hl	**Per stimolare l'allegagione** applicare il prodotto 15-20 giorni prima della fioritura impiegando 5-8 hl/ha di soluzione.
Colture floreali	1-2 compresse/hl	**Per anticipare ed aumentare la fioritura e migliorare talvolta la qualità dei fiori** stessi, trattare quando compaiono i boccioli.
Patata	1/10 o 1/2 compressa/hl	**Per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme**, si immergono per 10 minuti in una soluzione di 1/10 di compressa/hl in caso di tuberi selezionati e 1/2 compressa/hl per tuberi interi, avendo cura di asciugare i tuberi e seminare subito dopo; nel caso di tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pre-germinazione.
Vite: uva da tavola senza semi	2-3 compresse/hl	**Per allungare il rachide** trattare in pre-fioritura con tralcio di 4-8 cm (2 compresse/hl); **per diradare il grappolo** trattare al 30-40% della fioritura (2 compresse/hl); **per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro (3 compresse/hl)**.
Vite: uva da vino con semi	0,5-1 compresse/hl	**Per allungare il rachide** sulle varietà a grappolo compatto tipo Tocai, Picolit, Chardonnay, ecc., trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm impiegando 200-300 L/ha di acqua.
Ciliegio dolce	1-2 compresse/hl	**Per aumentare la consistenza e la pezzatura** trattare all'epoca dell'invaiatura.
Ciliegio acido	1-2 compresse/hl	**Per la riduzione dei danni provocati dal "Giallume virotico", per la scarsa vigoria e bassa produzione,** trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali.
Sedano, Pomodoro, Spinacio, Zucchino	2-4 compresse/hl	**Per la stimolazione dello sviluppo e per limitare lo stress da freddo,** trattare 4-5 settimane prima della raccolta impiegando 300-500 L/ha di soluzione.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GF0207 8 029816 052074 ASTUCCIO CON 10 COMPRESSE DA 5 g 25x10 COMPRESSE IVA 10%