

VELVET BIOTECH

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NPK + C 3-4-3 +15

VELVET BIOTECH è un concime organico NPK liquido derivato da materie prime di diversa natura, applicabile in fertirrigazione e mediante irrorazione fogliare. L'associazione sinergica tra la componente nutrizionale, completamente organica, e la presenza di sostanze ad azione biostimolante, conferisce al prodotto elevata efficacia e flessibilità di utilizzo nelle diverse fasi fenologiche. La peculiarità del prodotto risiede nella speciale tecnologia di estrazione che consente di concentrare il **fosforo in forma organica** *(fosfolipidi e fitati)* rendendolo disponibile per l'assimilazione delle piante, caratteristica unica tra i prodotti ammessi per l'utilizzo in **agricoltura biologica** nei quali spesso è utilizzato fosforo minerale poco disponibile per le colture. **VELVET BIOTECH** presenta un elevato contenuto di aminoacidi derivati da processi di idrolisi enzimatica, in particolare aminoacidi essenziali tra cui, Triptofano (coinvolto nella sintesi delle auxine), Metionina e Lisina (induttori di maturazione), Prolina (osmo-protettore in grado di aumentare la resistenza a stress idrico e termico). La presenza infine di **acidi organici**, **acidi umici e fulvici**, **betaine** e **polisaccaridi** stimola la proliferazione delle radici e l'assorbimento dei nutrienti anche in suoli poveri e stanchi.
VELVET BIOTECH può essere utilizzato a partire dal trapianto delle specie orticole e industriali (es. mais), dove esercita una spiccata azione starter sui processi di radicazione, durante tutto il ciclo di sviluppo della coltura per sostenere la fioritura e l'accrescimento vegetativo, in fase di maturazione per favorire e uniformare le caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei frutti.

AVVERTENZE E MISCIBILITÀ

Non miscelare con prodotti a base di rame, zolfo, nitrato di calcio, oli minerali. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra -2 °C e 35 °C. In caso di lunghi stoccaggi agitare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo. In caso di fuoriuscita, raccogliere con segatura e/o sabbia.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	**3%**
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	**4%**
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	**3%**
Carbonio (C) organico	**15%**
Contiene acidi umici e fulvici (24%)	

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH (sol.1%)	**4,2 ± 0,5**
Peso specifico a 20°C	**1,2 kg/L**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	FERTIRRIGAZIONE	FOGLIARE	MODALITÀ D'IMPIEGO
Pomacee, Drupacee, Vite da vino e da tavola, Agrumi, Actinidia, Kaki, Olivo, Melograno	15-20 L/ha	250-350 ml/hl	2-3 interventi in pre-fioritura, allegagione e sviluppo frutto
Colture orticole in serra, Fragola, Piccoli frutti, Baby leaf	2,5-4 L/1000 m^2		A partire da 15-20 gg dopo il trapianto, in post-allegagione e ogni 10-15 gg fino alla maturazione
Colture industriali e Orticole in pieno campo	20 L/ha		A partire da 20-25 gg dopo il trapianto, post-allegagione e ogni 15 gg fino alla maturazione
Colture floricole e aromatiche, vivai	3,5-4 L/1000 m^2		A partire da 10-20 gg dopo il trapianto, pre-fioritura, successivamente ogni 15-20 gg

GF0538 8 029816 055389 TANICA 1x20 L IVA 4%

GF0539 8 029816 055396 IBC 1x1.000 L IVA 4%