

VITASTIM TOP4

BIOSTIMOLANTE DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI AMMINOACIDI

VITASTIM TOP4 è un **biostimolante di origine vegetale**, appositamente studiato per stimolare e ottimizzare il processo naturale della fioritura: **sviluppo del fiore, impollinazione, fecondazione e allegagione** (sia che queste fasi avvengano consecutivamente o separatamente). La sua applicazione favorisce la sintesi di proteine specifiche nei momenti di maggiore richiesta energetica delle colture. **VITASTIM TOP4** svolge un'azione straordinaria sul metabolismo della pianta, **attiva i processi fisiologici della pianta, favorisce la fioritura, aumenta lo sviluppo vegetativo** e **migliora la produzione finale**. Fornisce, inoltre, una **maggiore capacità di adattamento** a condizioni avverse di salinità, siccità, temperatura e trapianto. Stimola il **ripristino dei tessuti vegetali** dopo un periodo di stress.

VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIONALI

- Ottimo assorbimento nella pianta.
- Favorisce il processo della fioritura.
- Migliora la qualità dell'allegagione.
- Migliora l'attività degli impollinatori.
- Aumenta la qualità e la vitalità del polline.
- Nettare di alta qualità.

MISCIBILITÀ

Non mescolare con prodotti che contengono rame, zolfo, oli minerali o prodotti alcalini.
Non applicare su prugni.

COMPOSIZIONE

Amminoacidi totali	**24%**
Amminoacidi liberi	**23%**
Grado di idrolisi	**95%**

PARAMETRI TECNICI E FISICO-CHIMICI

pH (sol. 1%)	**7,5**
Peso specifico a 20°C	**1,18 kg/L**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSE FOGLIARE	DOSE FERTIRRIGAZIONE	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Orticole in campo e in serra	200-400 ml/hl 2-3 L/ha	5-15 L/ha	**Fogliare:** 2-3 applicazioni nei periodi ad attività intensa. **Fertirrigazione:** 3-4 applicazioni nei periodi ad attività intensa.
Agrumi, Frutta secca e Alberi da frutto	100-200 ml/hl 2-3 L/ha	15-25 L/ha	**Agrumi:** 1ª applicazione quando il 25%-50% dei fiori sono aperti; 2ª applicazione quando il 75%-85% dei fiori sono aperti; 3ª applicazione facoltativa per garantire la allegagione. **Frutta secca:** 1ª applicazione quando il 25% dei fiori sono aperti (bocciolo rosa); 2ª applicazione quando il 75% dei fiori sono aperti. **Alberi da frutto:** Sboccio delle gemme, pre-fioritura e fruttificazione.
Vite e uva da tavolo	100-200 ml/hl 1,5-2,5 L/ha	10-20 L/ha	**Fogliare:** 1ª applicazione: pre-fioritura; 2ª applicazione: caduta della corolla a cappuccio o fruttificazione. **Fertirrigazione:** Nel corso dell'intero ciclo. 2-4 applicazioni nei periodi a elevato fabbisogno energetico.
Ulivo	100-300 ml/hl 2-4 L/ha	15-25 L/ha	1ª applicazione: Pre-fioritura. 2ª applicazione: Caduta dei petali.
Colture estensive e industriali: cereali, riso, mais, ecc.	1-3 L/ha	5-10 L/ha	Applicare nelle fasi di crescita.
Potenziatore erbicidi liquidi	0,5-1,5 L/ha	-	Utilizzare mescolato con gli erbicidi di post-emergenza in un'unica applicazione.

GF0502	8 029816 055020	FLACONE	12x1 L	IVA 4%
GF0468	8 029816 054689	TANICA	4x5 L	IVA 4%