

Reg. Ministero della Salute
n. 16183 del 09/12/2014

DELTASEC

INSETTICIDA

DELTASEC è un insetticida che **agisce per contatto e ingestione**, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con grande sicurezza d'impiego.

INSETTICIDA PIRETROIDE CHE AGISCE PER CONTATTO E INGESTIONE



PERICOLO:
H226 - H302 - H304 - H318 - H332 - H335 - H336 - H400 - H410 - EUH066 - EUH401

COMPOSIZIONE

Deltametrina pura **2,81% (25 g/L)**

FORMULAZIONE

Concentrato Emulsionabile (EC)

COMPATIBILITÀ

DELTASEC è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di **DELTASEC** preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	INSETTI CONTROLLATI E DOSE	NUMERO DI TRATT. ALL'ANNO	INTERVALLO TRA I TRATT. (giorni)
Frutticoltura (Melo, Pero, Pesco, Albicocco)	Contro Psilla **0,75 L/ha** per Melo, Pesco, Albicocco e **0,70 L/ha** per Pero; contro Afide verde del Melo, Afide del Pesco *(Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae)* **0,3-0,5 L/ha**; contro Cocciniglia di S. Josè **0,5-0,75 L/ha** (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro Carpocapsa **0,30 L/ha**; contro Cidia e Anarsia **0,50-0,70 L/ha**; contro Capua, Cacoecia ed altri tortricidi **0,30-0,50 L/ha**; contro microlepidotteri del Melo e del Pero **0,30-0,50 L/ha**. Contro Antonomo, Maggiolino, Tentredini, Tripidi, Cecidomidi e Mosca della frutta **0,30-0,50 L/ha.**	2	14
Viticoltura	Contro Tignole **0,40-0,60 L/ha**; contro Piralide, Nottue, Cicaline, Afidi, Sigaraio **0,30-0,50 L/ha**	2	14
Olivicoltura	Contro Saissetia **0,40-0,60 L/ha**; contro Tignola *(Prays oleae)* e Tripide **0.50 L/ha**; contro Mosca delle olive **0,50 L/ha**, in trattamento preventivo.	2	14
Orticoltura: Lattughe ed Insalate (escluso la Scarola e le baby leaf di Cicoria, Spinacio e Bietola da foglia), Cipolla, Porro, Cetrioli, Melanzane, Pomodori, Peperoni, Piselli, Fagioli, Fagiolini, Fave, Carote, Patate (solo uso in campo), Fragole	Contro Dorifora, Altiche, Cavolaia, Nottue, Tripidi e Tentredini **0,30 L/ha**; contro Afidi, Aleurodidi, Cimici, Piralide, Cassidе, Tignola, Mosca e Depressaria **0,50 L/ha.**	2	14 (7 gg in serra per tutte le colture eccetto Fragola e Fagioli-Fagiolini).
Mais (trattamenti primaverili-estivi)	Contro Nottue e Tripidi **0,30 L/ha**; contro Afidi, Cimici, Piralide e Diabrotica **0,50 L/ha**.	2	14
Frumento (trattamenti primaverili-estivi)	Contro Nottue, Tripidi e Afidi **0,30 L/ha**; contro Cimici **0,50 L/ha**.	2	14
Frumento, orzo (trattamenti autunnali)	Contro Afidi vettori del nanismo giallo **0,3-0,5 L/ha**, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.	2	14