

Reg. Ministero della Salute
n. 16542 dell'11/01/2016

LAOTTA

INSETTICIDA-ACARICIDA AD AZIONE TRANSLAMINARE, EFFICACE PER INGESTIONE E CONTATTO DIRETTO, PER L'IMPIEGO IN SERRE PERMANENTI SULLE COLTURE DI POMODORO, MELANZANA, MELONE, ZUCCA, COCOMERO, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO, FRAGOLA

LAOTTA è un insetticida-acaricida contenente Abamectina, principio attivo **efficace nei confronti di tutte le forme mobili di insetti ed acari.** Per raggiungere la massima mortalità dei fitofagi possono essere necessari anche 3-5 giorni in seguito all'intervento con **LAOTTA**. Dopo l'applicazione gli insetti e gli acari riducono sensibilmente l'alimentazione; quindi, il danno procurato in questa epoca è minimo.

INSETTICIDA-ACARICIDA AD AZIONE TRANSLAMINARE



PERICOLO:
H302 - H318 - H304 - H336 - H373 - H410 - EUH066 - EUH401

COMPOSIZIONE

Abamectina pura **1,89% (18 g/L)**

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (EC)

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	INSETTI CONTROLLATI	DOSE	VOLUME DI IRRORAZIONE (L/ha)	NUMERO MAX DI TRATT. ALL'ANNO	INTERVALLO TRA I TRATT. (giorni)	EPOCA D'IMPIEGO
Pomodoro (in serre permanenti)	Ragnetti rossi *(Tetranychus urticae, Polyphagotarsonemus latus)*, Eriofide *(Aculus lycopersici)*	**50-100 ml/hl (0,15–1,0 L/ha)**	300-1.000	1-3	7	Alla comparsa delle prime forme mobili.
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*					Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.
Melanzana (in serre permanenti)	Ragnetto rosso *(Tetranychus urticae)*	**50-80 ml/hl (0,15-0,8 L/ha)**				Alla comparsa delle prime forme mobili.
Melone, Zucca, Cocomero, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino (in serre permanenti)	Ragnetto rosso *(Tetranychus urticae)*	**50-100 ml/hl (0,15-1,0 L/ha)**		1-2		Alla comparsa delle prime forme mobili
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*					Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.
Fragola (in serre permanenti)	Ragnetti rossi e gialli *(Tetranychus urticae, Phytonemus pallidus)*	**50-100 ml/hl (0,15-1,0 L/ha)**				Alla comparsa delle prime forme mobili.
	Minatrici fogliari *(Liriomyza spp.)*					Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti almeno:
3 giorni prima della raccolta per
Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Zucca, Cocomero, Fragola.

AVVERTENZA

Per trattamenti su Melone, Cocomero, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino e Fragola non trattare nel periodo invernale compreso tra novembre e febbraio.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

EST0768	FLACONE	12x1 L	IVA 10%	**EST0767**	TANICA	4x5 L	IVA 10%