

Reg. Ministero della Salute
n. 18563 del 22/07/2024

PASSION

FUNGICIDA SISTEMICO AD ATTIVITÀ PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE PER LA LOTTA CONTRO L'OIDIO DEL MELO, PERO, PESCO, VITE, TABACCO, COLTURE ORTICOLE ED ORNAMENTALI, FRAGOLA E RIBES

PASSION è un fungicida sistemico a base di Penconazolo ad **ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante** con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

ATTIVITÀ PREVENTIVA, CURATIVA E BLOCCANTE

ATTENZIONE:
H319 - H361D - H411 - EUH401

COMPOSIZIONE
Penconazolo puro **10,1% (100 g/L)**

FORMULAZIONE
Concentrato emulsionabile (EC)

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

COLTURE	AVVERSITÀ CONTROLLATE	DOSI (ml/hl)*	DOSI (ml/ha)	APPLICAZIONE
Vite (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe necator)* Marciume nero della vite *(Guignardia spp.)*	30	300	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8-12 giorni tra la terza foglia distesa e la maturazione
Melo e Pero (pieno campo)	Oidio *(Podosphaera leucotricha)*	30	450-500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Pesco (pieno campo)	Oidio *(Podosphaera tridactyla, Sphaerotheca pannosa)*	50	600-750	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni a partire da fine caduta petali
Tabacco (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni dallo stadio di accestimento
Melone, Cocomero (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Melone, Cocomero (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione
Cetriolo (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Cetriolo (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra lo sviluppo terza foglia e la piena maturazione
Pomodoro (pieno campo)	Oidio *(Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Pomodoro (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra la quarta foglia distesa e la piena maturazione
Peperone (pieno campo e serra)	Oidio *(Leveillula taurica)*	50	500	Massimo 2 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'inizio accestimento e la piena maturazione
Zucchino (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucchino (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra la terza foglia distesa e la piena maturazione
Zucca (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)*	50	500	Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 10 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione
Zucca (serra)				Massimo 3 applicazioni intervenendo ogni 8 giorni tra l'infiorescenza e la piena maturazione