

Reg. Ministero della Salute
in corso di Registrazione

STARBLAST

FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

STARBLAST è un fungicida di contatto con proprietà translaminari.
STARBLAST contiene Pyrimethanil, appartenente alla famiglia chimica delle anilinopirimidine ed attivo principalmente contro la **Muffa grigia della Vite e delle altre colture agrarie e la Ticchiolatura delle Pomacee.**
STARBLAST esplica la sua attività biologica inibendo nei funghi patogeni sensibili la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione.

FUNGICIDA DI CONTATTO CON PROPRIETÀ TRANSLAMINARE



ATTENZIONE:
H317 - H411
EUH208 - EUH401

COMPOSIZIONE
Pyrimethanil puro **37% (400 g/L)**

FORMULAZIONE
Sospensione Concentrata (SC)

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

STARBLAST si applica come spray fogliare quando sono visibili i primi sintomi della malattia secondo le seguenti raccomandazioni:

COLTURE	AVVERSITÀ CONTROLLATE	DOSE (L/ha)	VOLUME DI ACQUA (L/ha)	NUMERO DI APPLICAZIONI	INTERVALLO FRA LE APPLICAZIONI	PERIODO DI APPLICAZIONE
Fragola (in pieno campo)	Botrite *(Botrytis cinerea)*	2	600-1.000	2	7-14 giorni	Dall'allegagione alla raccolta (BBCH 71-89)
Lattuga (in pieno campo)	Botrite *(Botrytis cinerea)*	2	600-1.000	2	10-14 giorni	Dall'ottava foglia e durante lo sviluppo vegetativo della pianta (BBCH 18-43)
Pomodoro e Melanzana (in pieno campo)	Botrite *(Botrytis cinerea)*	1,5	700-1.000	2	10-14 giorni	Durante lo sviluppo dei frutti (prima della maturazione) (BBCH 71-79)
Vite (Uva da vino, Uva da tavola)	Botrite *(Botrytis cinerea)*	2,5	600-1.000	1	-	Da fine fioritura fino all'invaiatura (BBCH 68-69-85)
Melo e Pero	Ticchiolatura *(Venturia spp)*	1,1-1,5	600-1.000	3-4	7-10 giorni	Dalla comparsa dei mazzetti fiorali fino a quando i mazzetti sono divaricati e dalla fine della caduta dei petali a inizio allegagione (escluso tutto il periodo di fioritura) (BBCH 53-59 e 69-71)

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti almeno:

- **56 giorni** prima della raccolta per **Melo e Pero**;
- **27 giorni** prima della raccolta per **Uva da vino**;
- **21 giorni** prima della raccolta per **Uva da tavola**;
- **14 giorni** prima della raccolta per **Lattuga**;
- **3 giorni** prima della raccolta per **Fragola, Pomodoro e Melanzana**.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GA0111 8 029816 061113 FLACONE 12x1 L IVA 10%