

Reg. Ministero della Salute
n. 14837 del 13/06/2011

TARTAN

ERBICIDA AD AZIONE FOGLIARE, SISTEMICO, NON SELETTIVO E NON RESIDUALE

TARTAN è un **erbicida fogliare non selettivo** per il **controllo di graminacee e dicotiledoni annuali e perenni.** Non è attivo su muschi. Il prodotto viene assorbito dalle foglie e trasportato verso l'apparato radicale. Per questa ragione è necessario trattare su infestanti con foglie verdi ben sviluppate.

ISTRUZIONI PER L'USO: il prodotto va impiegato per irrorazioni su infestanti ben sviluppate con volumi di 100-300 litri di soluzione per ettaro, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (max 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva. Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate).
In tutte le applicazioni non superare la dose complessiva di 4,320 kg/ha di sostanza attiva nell'arco dell'anno, corrispondente a 12 L/ha di prodotto per anno.

ERBICIDA
SISTEMICO
NON SELETTIVO
NON RESIDUALE

CONDIZIONI CLIMATICHE: i migliori risultati si ottengono con tempo nuvoloso, cielo coperto e umidità elevata durante il trattamento. È sconsigliato effettuare il diserbo se c'è rischio di pioggia nelle 6 ore dopo il trattamento o c'è il rischio di gelate. Irrigazioni o piogge cadute entro le 2 ore dal trattamento possono ridurre l'efficacia e l'attività erbicida del prodotto sulle infestanti già emerse. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse quali siccità, freddo, ecc., potrebbe essere inefficace. Le temperature medie e l'alta umidità facilitando la vegetazione delle infestanti favoriscono l'esito del diserbo. Le infestanti perenni sono più sensibili se ben sviluppate, in fioritura o in uno stadio più avanzato.



H411 - EUH 401

COMPOSIZIONE

Glifosate acido puro *(da sale isopropilamminico)* **30,6% (360 g/L)**

FORMULAZIONE

Concentrato solubile (SL)

CAMPI D'IMPIEGO

- <u>Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco purché ben lignificato:</u> **Agrumi, Pomacee (Melo, Pero), Noce, Nocciolo, Vite e Olivo (eccetto le olive raccolte da terra) - Olivo da olio:** nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 L/ha almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta.
- <u>Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco anche se ben lignificato:</u> **Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarine, Pesco e Susine), Mandorlo, Actinidia. Piante Floricole e Ornamentali, Forestali, Vivai di pioppo.**
- <u>Colture sulle quali occorre assolutamente evitare ogni contatto e il diserbo richiede esclusivamente l'uso di attrezzature selettive (barre lambenti, umettanti o a goccia):</u> **Orticole (Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Fagiolino, Fava, Pisello), Rosa.**
- <u>Terreni senza coltura</u>, prima o dopo la coltivazione di **Fragola, Ortaggi, Barbabietola da zucchero, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Mais, Riso, Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone, Prati, Vivai** prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione o di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
- <u>Aree non destinate alle colture agrarie</u>: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili (esclusi parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), sedi ferroviarie. Su argini di canali e fossi il prodotto deve essere impiegato a non meno di 30 giorni dall'immissione dell'acqua.

DOSI D'IMPIEGO

La singola applicazione non deve eccedere la dose di impiego di 6,33 L/ha di formulato (equivalente a 2,28 kg/ha di sostanza attiva). I trattamenti possono essere eseguiti su tutta la superficie o a bande lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego riferite a ettaro di superficie effettivamente trattata variano in funzione della specie delle infestanti.

- **1,5-4 L/ha:** Coda di topo *(Alopecurus spp.)*, Avena selvatica *(Avena spp.)*, Orzo selvatico *(Hordeum murinum)*, Loietto *(Lolium spp.)*, Mercorella *(Mercurialis spp.)*, *Fienarola (Poa spp.)*, Riso crodo, Sedano selvatico *(Ammi majus)*, Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Calendula *(Calendula spp.)*, Farinaccio *(Chenopodium spp.)*, Succiamele *(Orobanche spp.)*, Porcellana *(Portulaca spp.)*, Ravanello selvatico *(Raphanus spp.)*, Senecio *(Senecio spp.)*, Senape *(Sinapis spp.)*, Centocchio *(Stellaria spp.)*, veronica *(Veronica spp.)*.
- **4-5 L/ha:** Agropiro *(Agropyron repens)*, Carice *(Carex spp.)*, Stoppione *(Cirsium spp.)*, Euforbia *(Euphorbia spp.)*, Gliceria *(Glyceria spp.)*, Erba di San Giovanni *(Hypericum spp.)*, Serla *(Laersia oryzoides)*, Scagliola *(Phalaris spp.)*, Romice *(Rumex spp.)*, Grespino *(Sonchus spp.)*, Sorgo selvatico *(Sorghum halepense)*.
- **5-6,33 L/ha:** Mestolaccio *(Alisma spp.)*, Asfodelo *(Asfodelus spp.)*, Fiorone *(Butomus spp.)*, Zigolo *(Cyperus spp.)*, Ferula *(Ferula spp.)*, Giunco *(Juncus spp.)*, *Cervino (Nardus spp.)*, Scirpo *(Scirpus spp.)*, Sparganio *(Sparganium spp.)*, Farfaraccio *(Tussilago spp.)*.
- **4-6 L/ha per Arbusti:** Acero *(Acer spp.)*, Frassino *(Fraxinus spp.)*, Ginestra *(Genista spp.)*, Salice *(Salix spp.)*, Sambuco *(Sambucus spp.)*, Mirtillo *(Vaccinum spp.)*.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti almeno:

- **60 giorni** prima della raccolta per **Carciofi, Pomodori e Melanzane**;
- **30 giorni** prima della raccolta per **Piselli, Fagiolini e Fave**;
- **21 giorni** prima della raccolta per **Frutteti, Vite, Kiwi, Drupacee, Agrumi e Noci**;
- **7 giorni** prima della raccolta per **Olivo da olio**;

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Intervenire solo su infestanti in attiva crescita.
Il trattamento di post-emergenza è efficace se le infestanti si presentano nei primi stadi dello sviluppo (altezza max 10 cm). **L'impiego su infestanti a foglia larga ben sviluppate potrebbe essere inefficace.**

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GA0117	8 029816 061175	FLACONE 12x1 L IVA 10%	GA0118	8 029816 061182	TANICA 4x5 L IVA 10%	GA0119	8 029816 061199	TANICA 1x20 L IVA 10%