

ANTIZANZARA COMPRESSE

INSETTICIDA ANTILARVALE A BASE DI PYRIPROXYFEN, IN COMPRESSE A RILASCIO IMMEDIATO

È un insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen, appartenente alla classe dei regolatori di crescita (I.G.R.), **attivo a bassi dosaggi e dotato di azione residuale.** La sua azione si esplica impedendo lo sfarfallamento delle comuni zanzare presenti sul territorio nazionale (*Culex pipiens, Aedes albopictus*). **PROXILAR® COMPRESSE** contiene Denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio. **PROXILAR® COMPRESSE** contrasta il normale sviluppo delle zanzare nei ristagni d'acqua. Il principio attivo Pyriproxyfen viene rilasciato nelle acque infestate nell'arco di poche ore dal momento della immissione della compressa. **A 48 ore dal rilascio la maggior parte delle larve (non delle pupe) subisce una contaminazione irreversibile che impedisce la trasformazione delle larve in zanzare adulte.** L'inibizione della comparsa degli stadi alati avviene a seguito di un'alterazione nell'equilibrio ormonale dell'insetto. L'azione del principio attivo Pyriproxyfen non è influenzata dalla normale carica organica presente nell'acqua stagnante all'interno di tombini, pozzetti e griglie per la raccolta dell'acqua piovana. **Per un controllo continuativo** si consiglia l'applicazione **ogni 2-3 settimane.**

INSETTI CONTROLLATI



LARVE ZANZARA

PRODOTTO BIOCIDA PT 18
Autorizzazione del Ministero della Salute
n. IT/2018/00486/AUT

COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro	**0,5 g**
Denatonio benzoato	**0,001 g**
Coformulanti q.b. a	**100 g**

FORMULAZIONE

Compresse da 1 g o 2 g

DOSE


Tombini: 1 compr./tombino.
Altre ristagni:
1 compr./40 L d'acqua stagnante

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

INSETTI CONTROLLATI	MODALITÀ	DOSE	NOTE
Larve di zanzara	Tombino o caditoia	1 compr./tombino	Applicare le compresse all'interno di tombini o pozzetti che ospitano ristagni d'acqua.
	Altri tipi di ristagni	1 compr./40 L di acqua circa	Utilizzare una compressa da 2 g in ristagni di circa 40 litri, per un periodo di 2-3 settimane (fino a 5 trattamenti/anno).

AVVERTENZA: EVITARE l'applicazione di **PROXILAR® COMPRESSE** se è stata segnalata una elevata probabilità di precipitazioni nelle successive 36-48 ore.

AMBIENTE



TOMBINI



ACQUE STAGNANTI

PMC-BIOCIDI

GH0388	8 029816 033882	BARATTOLO	12x100 g (=100 cpr)	IVA 22%	GH0389	8 029816 033899	BARATTOLO	12x750 g (=375 cpr)	IVA 22%