

PRODOTTO BIOCIDA PT 18
Autorizzazione del Ministero della Salute
n. IT/2023/00878/BB

INSETTICIDA SUPREME

INSETTICIDA CONCENTRATO A LARGO SPETTRO D'AZIONE CON EFFETTO ABBATTENTE E LUNGA AZIONE RESIDUALE

CIP OFF è un insetticida in formulazione concentrato emulsionabile a base di Cipermetrina, efficace sugli insetti (striscianti e zanzare) negli ambienti domestici e civili. La Cipermetrina conferisce alla formula **un rapido effetto abbattente e una potenza residua che dura fino a 4 settimane.** La formulazione è priva di composti organici volatili. **CIP OFF** è utilizzato in agglomerati urbani, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni, edifici privati e pubblici (ospedali, alberghi, scuole, negozi, cinema, caserme, ecc.), aree industriali interne. **CIP OFF** può essere utilizzato anche in cucine, bar, ristoranti, mense aziendali, industrie alimentari (caseifici, macellerie, depositi e silos vuoti, tabaccherie) avendo l'accortezza di rimuovere gli alimenti al fine di escludere la contaminazione degli stessi. L'uso del prodotto è consigliato anche contro le zanzare, trattando aree verdi, cespugli, prati, siepi, viali alberati, piante ornamentali.

INSETTI CONTROLLATI


FORMICHE


ZANZARE


PAPPATACI


ZECCHE


SCARAFAGGI

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura 100%	**10,53 g**
DPM (2-metossimetil-etossi propanolo)	**54,47 g**
Coformulanti q.b. a	**100 g**

FORMULAZIONE

Emulsione concentrata

DOSE

50/100 ml
in 10 L di acqua

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

INSETTI CONTROLLATI	DOSE	SUPERFICIE TRATTATA	NOTE
Insetti striscianti	10 ml/1 L di acqua (1%)	50 ml di soluzione per 1 m²	Applicare solo su aree ristrette e su superfici non pulite regolarmente, ad esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, dove solitamente si nascondono gli insetti. Applicare nelle fessure e nelle fughe delle superfici quali: piastrelle di ceramica, marmo, granito e altre superfici in pietra dura, metalli (acciaio, ferro, ecc..), plastica, vetro (es: vetri delle finestre), legno compensato verniciato.
Zanzara tigre	2 ml/1 L di acqua (0,2%)	50 ml di soluzione per 1 m²	Trattare intorno all'edificio partendo da un'altezza di circa 50 cm, fino a 150 cm, trattando una fascia di circa un metro di altezza. L'azione residua del prodotto è di 3 giorni.
Eradicazione dei nidi di Formiche all'aperto	5 ml/1 L di acqua (0,5%)	25 ml di soluzione per 1 nido	Applicare intorno e all'ingresso del nido, spruzzando una singola applicazione per sradicare il nido.

AVVERTENZA: il prodotto deve essere applicato in modo tale che i bambini, gli animali da fattoria e gli animali domestici, in particolare i gatti, non ne entrino in contatto. Tenere i gatti lontani dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità ai piretroidi, il prodotto può causare gravi reazioni avverse nei gatti. Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione. Se presente, spegnere il filtro dell'aria dell'acquario durante la spruzzatura.

AMBIENTE


ABITAZIONI


LOCALI PUBBLICI


CIVILE


ZOOTECNICI


LOCALI AD USO INDUSTRIALE


MEZZI DI TRASPORTO


ATTENZIONE:
H410

RAPIDO ABBATTIMENTO E LUNGA AZIONE RESIDUALE

USO PROFESSIONALE

GH0161 8 029816 031611 FLACONE 24x250 ml IVA 22%

USO PROFESSIONALE

GH0162 8 029816 031628 FLACONE 12x1 L IVA 22%