

Reg. Ministero della Salute
n. 16585 del 11/03/2016

ERBICIDA ANTIGERMINELLO
PENDICOL 33 EC

DISERBANTE PER IL CONTROLLO DI INFESTANTI ANNUALI GRAMINACEE E DICOTILEDONI

PENDICOL 33 EC è un diserbante liquido da applicare sul terreno nelle fasi di pre-emergenza, pre e post-trapianto che **inibisce la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli** delle maggiori infestanti annuali, sia graminacee che dicotiledoni. Le infestanti sono anche controllate nello stato di plantula a condizione che non abbiano superato lo stadio di 2-3 foglie vere.
Infestanti **GRAMINACEE** controllate: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Setaria virdis* (Falso panico), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Panicum dichotomiflorum* (Giavone americano).
Infestanti **DICOTILEDONI** controllate: *Amaranthus spp., Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Chenopodium album* (Farinaccio selvatico), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Portulaca oleracea* (Erba cipollina), *Polygonum spp., Stellaria spp., Thlaspi arvense* (Erba storna).



TAPPETO ERBOSO

ALTRE COLTURE
Cereali e industriali: Mais, Girasole, Soia e Tabacco; **Colture frutticole:** Albicocco Melo, Pero, Pesco, Nettarina, Vite; **Colture orticole:** Arachide, Asparago, Broccoli, Cavolfiore, Carota, Cece, Fagioli, Fagiolini, Fava, Favino, Lattughe e simili (eccetto rucola), Patata, Peperone, Pisello; **Ornamentali** (anche in vivaio) e Pioppo.

COMPOSIZIONE
Pendimethalin puro **35,7% (330 g/L)**

FORMULAZIONE
Concentrato emulsionabile (EC)

DOSE
310-400 ml/1.000 m^2
in 20-80 L di acqua

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE DI UTILIZZO	NOTE
Tappeti erbosi	**Infestanti GRAMINACEE:** Coda di volpe *(Alopecurus myosuroides),* Sanguinella *(Digitaria sanguinalis),* Giavone comune *(Echinochloa crus-galli),* Giavone americano *(Panicum dichotomiflorum),* Pabbio *(Setaria viridis),* Sorghetta *(Sorghum halepense).* **Infestanti DICOTILEDONI:** Amaranto *(Amaranthus retroflexus),* Borsa del pastore *(Capsella bursa-pastoris),* Farinello comune *(Chenopodium album),* Papavero *(Papaver rhoeas),* Poligono persicaria *(Polygonum persicaria),* Erba porcellana *(Portulaca oleracea),* Centocchio *(Stellaria media),* Erba storna *(Thalaspi arvense).*	3,1-4 L/ha	Applicare in post-emergenza.

ISTRUZIONI PER L'USO: effettuare il trattamento su terreno ben livellato e lavorato. In assenza di pioggia dopo 7-10 giorni dal trattamento, irrigare in modo da favorire la penetrazione del prodotto nei primi strati superficiali del terreno. Seminare in modo uniforme ad una profondità di 3-4 cm, evitando che alcuni semi rimangano scoperti in superficie.
VOLUME DI IRRORAZIONE: applicare il prodotto con un quantitativo d'acqua pari a 200-800 L/ha in funzione del tipo di pompa impiegata. Impiegare la dose più alta in terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, mentre la dose più bassa in terreni sciolti.
AVVERTENZE: effettuare **un solo intervento per ciclo colturale** (per tutte le colture). Impiegare la dose più alta in terreni molto argillosi o ricchi di sostanza organica, mentre la dose più bassa in terreni sciolti.



PERICOLO:
H226 - H304 - H315 - H319
H361D - H410 - EUH401

AVVERSITÀ



GRAMINACEE



DICOTILEDONI

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GA0115	8 029816 061151	FLACONE	12x1 L	IVA 10%	GA0116	8 029816 061168	TANICA	4x5 L	IVA 10%