

Reg. Ministero della Salute
n. 14876 del 01/08/2010

GRANDSTAND

ERBICIDA PER DISERBO E DECESPUGLIAMENTO DELLE AREE INCOLTE E PER DISERBO SELETTIVO DEI TAPPETI ERBOSI DI GRAMINACEE

GRANDSTAND è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e, una volta assorbito e traslocato all'interno della pianta, controlla infestanti erbacee, arbustive e legnose sui tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo, così come in aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreni preparati per il trapianto di forestali. La sua azione si manifesta lentamente, devitalizzando la vegetazione in un lasso di tempo più o meno breve a seconda del tipo di infestante e dello stadio di sviluppo (da 5-7 giorni a 3-4 settimane). Non ha effetto residuale. Non è volatile. Utilizzato da solo, è selettivo per le graminacee spontanee, evitando l'effetto "vuoto biologico", vegetazione completamente secca o giallo-arancio che può portare all'erosione del suolo.



TAPPETO ERBOSO

EPOCA DI APPLICAZIONE: impiegare **GRANDSTAND dalla primavera fino all'autunno inoltrato** su infestanti in attiva vegetazione e che abbiano già sviluppato una adeguata superficie fogliare. Effettuare un solo trattamento per stagione, sia nelle aree incolte che nei tappeti erbosi.
Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; **non superare la quantità totale di 22 L/ha per stagione vegetativa.**

COMPOSIZIONE

Fluroxipir meptil puro (pari a 20 g/L di Fluroxipir acido)	**2,83% (28,8 g/L)**
Triclopir trietilammonio puro (pari a 60 g/L di Triclopir acido)	**8,23% (83,7 g/L)**

FORMULAZIONE

Concentrato emulsionabile (EC)

DOSE

400-800 ml/1.000 m^2
in 20-60 L di acqua

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE DI UTILIZZO	NOTE
Tappeti erbosi ad uso ornamentale e sportivo	**Contro infestanti erbacee:** Amaranto *(Amaranthus)*, Cardo *(Cirsium)*, Farinello *(Chenopodium)*, Grespino *(Sonchus)*, Malva *(Malva)*, Morella *(Solanum)* e Ortica *(Urtica)*	4-8 L/ha (in funzione del grado di infestazione)	Con infestanti in fase di attiva crescita (periodo primaverile e autunnale) in 200-600 l/ha di acqua, 3-4 giorni prima o dopo il taglio del tappeto erboso. Si consiglia di effettuare l'applicazione su tappeti erbosi in buone condizioni vegetative.
Aree incolte (aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreni preparati per il trapianto di forestali)	**Contro infestanti erbacee:** Amaranto *(Amaranthus)*, Cardo *(Cirsium)*, Farinello *(Chenopodium)*, Grespino *(Sonchus)*, Malva *(Malva)*, Morella *(Solanum)* e Ortica *(Urtica)*	4-8 L/ha	Con infestanti in fase di attiva crescita con volumi d'acqua di 200-600 L/ha. In caso di **applicazioni localizzate o su limitate porzioni di campo** per infestazioni a macchia, impiegare **1-1,5 L/hl.**
	Contro infestanti arbustive e legnose: Ailanto *(Ailanthus)*, Albero di Giuda *(Cercis)*, Betulla *(Betula)*, Biancospino *(Crateagus)*, Clematide *(Clematis)*, Corniolo *(Cornus)*, Caprifoglio o Madreselva *(Lonicera)*, Frassino *(Fraxinus)*, Gelso *(Morus)*, Olmo *(Ulmus)*, Ontano *(Alnus)*, Pruno *(Prunus)*, Quercia *(Quercus)*, Ranno *(Rhamnus)*, Robinia *(Robinia)*, Rovo *(Rubus)*, Salice *(Salix)*, Sambuco *(Sambucus)* e Sorbo *(Sorbus)*	6-8 L/ha	Con infestanti in fase di attiva crescita con volumi di acqua di 200-600 L/ha.
	Applicazioni localizzate su cespugli con altezza NON superiore a 1 metro	1,5-2 L/hl	Trattare non più del 20% della superfice unitaria.
	Applicazioni su cespugli di altezza superiore a 1 metro	1,5-2 L/hl	Si consiglia di ridurre la loro chioma e di impiegare **GRANDSTAND** non appena che i germogli siano ricresciuti.
	Per devitalizzare le ceppaie recise	Prodotto diluito in acqua (da 1:3 fino a 1:5)	Applicare sulla superficie appena recisa, per mezzo di spennellature, in qualsiasi periodo dell'anno.





ATTENZIONE:
H317 - H410
EUH401

AVVERSITÀ



ROVO



ROBINIA



AILANTO

ALTRE AVVERSITÀ: Infestanti erbacee, arbustive e legnose.

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GP0153 8 029816 041535 FLACONE 12x1 L IVA 10%