

Reg. Ministero della Salute
n. 18321 del 10/02/2023

NITIDE

ERBICIDA SISTEMICO SELETTIVO PER IL DISERBO DI INFESTANTI A FOGLIA LARGA SU TAPPETI ERBOSI

NITIDE è un erbicida sistemico selettivo di post emergenza che viene assorbito principalmente dalle foglie e traslocato rapidamente in tutta la pianta infestante. Il Fluroxypyr appartiene al gruppo chimico degli acidi piridin carbossilici. La modalità di azione del Fluroxypyr è classificata secondo HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) nel gruppo 4 (O) ovvero auxine sintetiche che agiscono come acido indolacetico (IAA). Attualmente, non è stato osservato alcun fenomeno di resistenza o di resistenza incrociata al Fluroxypyr sulle infestanti sensibili (Attaccamani, Centocchio comune, Canapetta comune, Convolvolo). Il rischio di sviluppo di resistenza nelle infestanti a foglia larga è improbabile e **NITIDE** può essere **usato anche per il controllo di infestanti resistenti a prodotti con diverso meccanismo d'azione** (ad esempio Centocchio comune, Romice, Attaccamani). **NITIDE** controlla le infestanti a foglia larga già emerse. L'efficacia non è influenzata dal tipo di terreno ma varia a seconda della specie dell'infestante, dello stadio di crescita (le infestanti giovani sono più suscettibili) e delle condizioni meteorologiche. L'efficacia è maggiore quando le infestanti sono in buone condizioni di crescita. L'efficacia può essere ridotta da basse temperature (meno di 10°C) o da condizioni di siccità.



TAPPETO ERBOSO

ALTRE COLTURE
Cereali: Frumento, Orzo, Triticale, Segale, Avena, Mais; **Colture frutticole:** Agrumi (Arancio, Pompelmo, Limone, Limetta, Mandarino), Olivo (da tavola e da olio), Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo).

COMPOSIZIONE
Fluroxypyr puro **19,39% (200 g/L)**
(sotto forma di 1-metileptil estere)

FORMULAZIONE
Emulsione olio/acqua (EW)

DOSE
100 ml/1.000 m^2
in 20-40 L di acqua

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE DI UTILIZZO	NOTE
Tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf e campi sportivi	**Infestanti sensibili:** Stramonio comune *(Datura stramonium)*, Lattuga selvatica *(Lactuca serriola)*, Malva selvatica *(Malva sylvestris)*, Romice crespa *(Rumex crispus)*, Erba morella *(Solanum nigrum)*, Trifoglio bianco *(Trifolium repens)*. **Infestanti mediamente sensibili:** Attaccamani *(Galium aparine)*, Aspraggine *(Helminthotheca echioides)* Piantaggine comune *(Plantago lanceolata)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Dente di leone *(Taraxacum officinale)*; Veronica edera *(Veronica hederifolia)*, Veronica comune *(Veronica persica)*.	1 L/ha	Applicare il prodotto tra l'inizio e il 50% dell'accestimento (BBCH 20-25).

VOLUME D'IRRORAZIONE: 200-400 L/ha a seconda dello sviluppo e della densità della vegetazione. Applicare su infestanti in attiva crescita, nei primi stadi di sviluppo.
MODALITÀ D'IMPIEGO: NITIDE deve essere distribuito con attrezzature che consentano una buona copertura della vegetazione. Applicare il prodotto ad una pressione di 2-3 bar. Evitare la deriva, specialmente vicino a colture sensibili. Non lasciare la soluzione di irrorazione nel serbatoio per lunghi periodi.

AVVERSITÀ



TRIFOGLIO BIANCO



CENTOCCHIO



SOFFIONE



H411 - EUH401
EUH208

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GP0227	FLACONE	12x1 L	IVA 10%