

U600 GIARDEN

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI

U600 GIARDEN è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza. L'impiego è preferibile con temperature comprese tra 12°C e 20°C, evitando applicazioni con temperature inferiori a 8°C e superiori a 25°C all'ombra. Il prodotto controlla le principali infestanti dicotiledoni e viene assorbito per via fogliare e viene traslocato nei meristemi di accrescimento e negli organi di riserva. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.



TAPPETO ERBOSO

ALTRE COLTURE: Prati e Pascoli, Lavanda, Lavandina e Mughetto.

Reg. Ministero della Salute
n. 18972 del 29/04/2025

COMPOSIZIONE

2,4-D acido equivalente a di 2,4-D sale dimetilamminico	50% (600 g/l) 60,2% (722 g/l)

FORMULAZIONE

Concentrato Solubile (SL)

DOSE

0,6-1,2 L/ha
(pari a 6-12 ml in 2-4 L di acqua per 100 m²)

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI CONTROLLATE	DOSE DI UTILIZZO	NOTE
Tappeti erbosi (parchi, giardini e campi sportivi)	**Erbe infestanti sensibili:** Cipero *(Cyperus esculentus)*, Equiseto *(Equisetum arvense)*, Erigero *(Conyza canadensis)*, Nappola *(Xanthium italicum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Ranuncolo dei campi *(Ranunculus arvensis)*, Farinello comune *(Chenopodium album)*, Grespino dei campi *(Sonchus arvensis)*, Stoppione *(Cirsium arvense)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Borsa pastore comune *(Capsella bursa-pastoris)*, Erba storna *(Thlaspi arvense)*, Veccia *(Vicia spp.)*. **Erbe infestanti mediamente sensibili:** Plantaggini *(Plantago spp.)*, Centocchio *(Anagallis arvensis)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Soffione *(Taraxacum officinale)*, Ortica minore *(Urtica urens)*, Vilucchio *(Convolvulus arvensis)*, Acetosa minore *(Rumex acetosella)*, Erba calenzuola *(Euphorbia heliscopia)*, Veccia *(Vicia angustifolia)*, Galinsoga *(Galinsoga parviflora)*.	0,6-1,2 L/ha (pari a 6-12 ml in 2-4 L di acqua per 100 m²)	Applicare in primavera o in autunno. Non superare la dose totale di **1,2 L/ha** (pari a un massimo di 12 ml su 1002) per anno sulla stessa superficie. Tutte le piante dicotiledoni sono sensibili all'azione del prodotto, pertanto prestare la massima attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante erbacee, arbustive od arboree che si vogliono preservare. **Attenzione: non trattare prati di dicondra, edera od altre dicotiledoni (foglie larghe).**
Prati e Pascoli		0,6-1,2 L/ha	Applicare sulle malerbe emergenti: in primavera-estate nella fase di attiva crescita dopo il taglio oppure in autunno per controllare le malerbe perenni

VOLUME D'IRRORAZIONE: 200-400 L/ha per tutti gli impieghi, con attrezzature a bassa pressione. Per applicazioni sui tappeti erbosi è consigliabile utilizzare il volume di 400 L/ha.
COMPATIBILITÀ: il prodotto non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto deve essere sempre **utilizzato su una coltura o un prato in buono stato vegetativo, evitando condizioni di stress.** Nel periodo estivo applicare il prodotto nelle ore più fresche della giornata. Evitare che la deriva raggiunga colture sensibili emerse (crocifere, leguminose, drupacee e pomacee, olivo, girasole, lattuga, barbabietola, pomodoro, vite, cetriolo, stramonio, tabacco e colture di fiori ornamentali e arbusti da frutto). Si consiglia l'impiego di ugelli antideriva.



PERICOLO:
H317 - H318 - H410 - EUH401

AVVERSITÀ



PLANTAGGINI



SOFFIONE



CIPERO

CONTRO LE INFESTANTI A FOGLIA LARGA

Prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Per le indicazioni complete delle misure di mitigazione fare riferimento all'etichetta ministeriale.

GF0509 8 029816 055099 FLACONE 12x1 L IVA 10%